

Fiche Repère

Double campagne vaccinale Covid et grippe

	Covid		Grippe saisonnière
	6 mois - 4 ans	≥ 5 ans	
Période	A partir du 2 octobre		A partir du 17 octobre 2023
Recommandations	<ul style="list-style-type: none"> • Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ou en contact régulier avec des personnes à risque de forme grave • Résidents des Ehpad, patients d'USLD • ≥ 65 ans • Femmes enceintes, quel que soit le trimestre • ≥ 6 mois ET à risque de forme grave (dont affection chronique, diabète, cancer, immunodéprimé, IMC ≥ 40) • Entourage des personnes immunodéprimées et des nourrissons < 6 mois présentant des risques de forme grave • Professionnels du voyage (navigants, accompagnateurs) 		
	Personnes atteintes de troubles psychiatriques, démence, trisomie 21		Professionnels exposés aux virus influenza porcins/aviaires
Avec quel vaccin	<ul style="list-style-type: none"> • Comirnaty® Omicron XBB.1.5 à 3 µg marron 	<ul style="list-style-type: none"> • Préférentiellement vaccin à ARNm adapté monovalent Comirnaty® Omicron XBB.1.5 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5-11 ans : à 10 µg bleu foncé ○ ≥ 12 ans : à 30 µg gris foncé • Sinon (sous condition ≥ 18 ans, hors grossesse) vaccin à protéine recombinante monovalent <ul style="list-style-type: none"> ○ Nuvaxovid® XBB.1.5 (à partir de nov. 2023) ○ VidPrevtyl® Beta (dans l'attente, utilisé 1 seule fois, que chez primo-vaccinés) 	Vaccin tétravalent <ul style="list-style-type: none"> • Remboursé à partir de 6 mois : <ul style="list-style-type: none"> ○ Fluarix Tetra® ○ Influvac Tetra® ○ Vaxigrip Tetra® • Remboursé à partir de 65 ans : <ul style="list-style-type: none"> ○ Efluelda®
Schéma vaccinal	<ul style="list-style-type: none"> • Primovaccination <ul style="list-style-type: none"> ○ Sans infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> - 3 doses - intervalles D1-D2 = 3 sem, D2-D3 = 8 sem ○ Infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> - après D1 : intervalle infection-D2 = 3 mois, pas de D3 - après D2 : intervalle infection-D3 = 3 mois • Rappel (déjà primovacciné ou infecté) <ul style="list-style-type: none"> - 1 dose unique - en respectant un délai de 6 mois - après la dernière infection ou injection 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 dose unique • en respectant un délai de 6 mois (ou 3 mois pour les immunodéprimés) après la dernière infection ou injection 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mois à 9 ans : <ul style="list-style-type: none"> ○ primo-vaccination : 2 doses (0,5ml) D1/D2 à 1 mois ○ rappel : 1 dose (0,5ml) annuelle • 9-59 ans : <ul style="list-style-type: none"> ○ 1 dose annuelle de 0,5ml ○ Fluarix Tetra®, Influvac Tetra®, Vaxigrip Tetra® • ≥ 60 ans : 1 dose annuelle <ul style="list-style-type: none"> ○ 0,5ml si Fluarix Tetra®, Influvac Tetra®, Vaxigrip Tetra® ○ 0,7 ml si Efluelda®

Possibilité de réaliser les 2 vaccins **en même temps** (un dans chaque bras, à partir du 17 octobre) OU **en décalé** (pas d'intervalle minimum à respecter entre les 2 injections).