



# TRUCS ET ASTUCES PICC



## Installation du patient

- Pour la personne âgée, la position en décubitus dorsal est plus confortable.
- Si le patient est agité, lui proposer de mettre le bras derrière la tête.



## Manipulation du stabilisateur

### StatLock®

A l'ablation : bien saisir les volets par le bas et replier les bords du pansement pour éviter de "coller" les gants.

A la pose : avant d'appliquer le stabilisateur sur le bras du patient, fermer les volets en prenant appui sur les doigts gantés.

### Grip-Lok®

Attention, il existe différentes références de Grip-Lok® correspondant à la taille des ailettes du PICC, le cathéter doit s'insérer parfaitement dans l'empreinte.

A la pose : décoller légèrement les bandelettes de protection de l'adhésif avant la mise en place sur la peau.



## Pansement de couverture transparent stérile

- Retiré par étirement latéral.
- Posé sans étirement, pour éviter le phénomène de rétractation, ce qui endommage la peau du patient.

## Manipulation des connectiques

Utiliser un antiseptique alcoolique pour la manipulation des connectiques (Chlorhexidine alcoolique minimum à 0,5%, povidone iodée alcoolique, alcool à 70%).

## Comment reconnaître un PICC équipé d'une valve bidirectionnelle intégrée ?



Si le PICC est équipé d'un **clamp**, la valve est à ajouter.



Si le PICC n'est pas équipé d'un clamp, la **valve** est intégrée.

## Comment protéger le bras en cas de douche ?

- Éduquer le patient et / ou l'entourage à l'utilisation du matériel de protection imperméable, par exemple : manchon de protection (type waterproof PICC Line protector) ou film alimentaire étirable (3-4 tours) dédié au PICC et stocké avec les dispositifs médicaux PICC.