

Douche



Patients ayant pris
AU MOINS UNE DOUCHE PREOPERATOIRE
(ou toilette complète) avant l'intervention

ARA : 99,5%

FR : 99,7%

Objectif
SPICMI
= 100%

La totalité des douches a été réalisée le jour même
(au domicile ou dans l'établissement)

Nettoyage/DéterSION



SI SOUILLURES VISIBLES (25 actes) :
nettoyage/déterSION réalisé(e)

ARA : 100%

FR : 99,0%

Objectif
SPICMI = 100%

Traitement des pilosités (peau glabre exclue)

Sites cutanés opérés
SANS DEPILATION PREALABLE

ARA : 31,0%

FR : 28,5%

Progression encore attendue

Quand **DEPILATION** réalisée
dans l'établissement

Vigilance SPICMI : 14% des dépilations avaient
pour motif une zone dépilatoire à forte pilosité

TONTE



ARA : 97,0%

FR : 98,1%

RASAGE MECANIQUE
en établissement



Objectif SPICMI
= 0%

à domicile

ARA : 3,0%

FR : 1,7%

ARA : 25,5%

FR : 29,8%

Vigilance SPICMI : les rasages réalisés à domicile interpellent sur
les informations données aux patients et intégrées dans la pratique

Antiseptie (la dernière avant incision)



ANTISEPTIE réalisée

ARA : 100%

FR : 99,9%

Objectif
SPICMI = 100%



avec un antiseptique **ALCOOLIQUE**

ARA : 86,6%

FR : 87,6%



par application **LARGE** avec un **SUPPORT**
et débutant par la ligne d'incision

ARA : 84,7%

FR : 80,0%



avec un **SECHAGE** spontané et complet

ARA : 66,7%

FR : 77,0%

Vigilance SPICMI : le respect du mode opératoire est primordial pour atteindre
les objectifs de destruction de la flore cutanée résiduelle avant incision

— Résultat satisfaisant

- - - Améliorations à poursuivre

- - - A revoir (objectif non atteint)

— A revoir rapidement

Respect des indications SFAR

ATBP indiquée
(N=175)



Objectif
SPICMI = 100%

ATBP RÉALISÉE
avant incision

ARA : 94,9%

FR : 91,0%

ATBP non indiquée
(N=41)



ATBP non RÉALISÉE

ARA : 95,1%

FR : 78,7%

Molécule/dose administrée (hors gentamicine et vancomycine)



MOLÉCULE ET DOSE
recommandées

ARA : 86,7%

FR : 87,0%



MOLÉCULE DIFFÉRENTE
des recommandations

ARA : 4,2%

FR : 6,7%



DOSE DIFFÉRENTE
des recommandations

ARA : 8,5%

FR : 6,3%




Dose de β -lactamines **NON DOUBLÉE**
en cas d'obésité sévère et poids > 100 kg

ARA : 14,3%

FR : 28,6%

Objectif SPICMI = 0%

Délai d'administration avant incision (hors vancomycine)



MESSAGES CLÉS à retenir en PREOPERATOIRE

Préparation cutanée



Ne pas raser
Ne pas dépiler




Respecter
le temps
de séchage

Antibioprophylaxie



Respecter
la posologie



Doubler la dose
de β -lactamines
Si obésité ++