


À vous de jouer !

- 1- Liquide organique excrété par les reins
- 2- Identification d'une maladie
- 3- Invasion et multiplication de micro-organismes dans le corps qui provoque un problème de santé
- 4- Meilleur moment de la journée pour réaliser un recueil d'urine
- 5- Flux d'urine, le premier part dans les toilettes
- 6- Produit appliqué après la toilette intime pour désinfecter, juste avant de réaliser le prélèvement
- 7- Adjectif qualifiant la toilette minutieuse à réaliser avant le recueil des urines
- 8- Récipient utilisé pour recueillir l'urine, à ne pas toucher au bord supérieur
- 9- À laver soigneusement à l'eau et au savon ou à frictionner avec un produit hydro-alcoolique avant la réalisation d'un ECBU



- 10- Exempt de tout micro-organisme
- 11- Lieu où sont effectuées les analyses
- 12- Examen CytoBactériologique des Urines

Pour toute question :
cpias-ara@chu-lyon.fr
cratb-aura@chu-grenoble.fr



- Réponses :
- 1- Urine
 - 2- Diagnostic
 - 3- Infection
 - 4- Matin
 - 5- Jet
 - 6- Antiseptique
 - 7- Intime
 - 8- Flacon
 - 9- Mains
 - 10- Stérile
 - 11- Laboratoire
 - 12- ECBU

Le p'tit guide qui coule de source...



Un prélèvement urinaire réussi

ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines)

Semaine de la sécurité du patient 2024

Parce que votre contribution est essentielle pour un bon diagnostic !

Qualité du diagnostic : tout se joue au moment du prélèvement !

Un prélèvement bien réalisé, non contaminé = une prise en charge adaptée !





1 Choisir le bon moment

Le matin au réveil ou 4 heures après une miction (= un pipi). Préparer le flacon, les compresses et un antiseptique.



2 Réaliser une toilette intime (parties génitales)

Pour éviter la contamination du prélèvement.



3 Se laver soigneusement les mains

Ou réaliser une friction hydro-alcoolique pour éviter la contamination lors de la manipulation du flacon.



vulve - pénis

4 Réaliser une désinfection des parties intimes

Avec une solution antiseptique.

 Femmes : écarter les petites lèvres, passer la compresse imbibée d'antiseptique d'avant en arrière, sans revenir vers l'avant.

 Hommes : décalotter le pénis, passer la compresse imbibée d'antiseptique de haut en bas.



5 Ouvrir le flacon stérile

Le manipuler sans toucher l'intérieur.
Poser le couvercle à l'envers.

6 Laisser couler le premier jet d'urine dans les toilettes

Puis recueillir le jet d'urine en cours de miction.

7 Refermer le flacon hermétiquement

Sans toucher l'intérieur.

8 Identifier

Votre prélèvement et le transmettre directement ou le stocker selon les consignes du laboratoire.