Revue des Actualités

Journée de Prévention du Risque Infectieux
en Etablissement Médico-Social

Bron – 3 octobre 2024

Caroline AUREL

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION DES INFECTIONS ET DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

Avril 2024 - Révisé par: DSDS 19 19 15 - 1028 459 483 243 - Crédits photo: Freepress - Not for use on private/public

[Site internet PRIMO](#)

NEW

Alerte Mpxv

Newsletter IFPS septembre 2024

Le CPias ARA a pour missions de prévenir le risque infectieux associé aux soins et de contribuer à la maîtrise de l'antibiorésistance tout au long du parcours de soin en appui aux professionnels et usagers des 3 secteurs de santé (sanitaire, médico-social, ville)

[Le CPias c'est qui, c'est quoi, c'est pour qui ?](#)

Nous contacter

Le CPias ARA contribue à la mission nationale [PRIMO](#) de prévention des infections et de l'antibiorésistance en secteur médico-social et soins de ville

Attention les liens des documents ont changé

ARRIVALS ↓

Lyon

Praticiens

Anne SAVEY
Médecin hygiéniste
Responsable CPias ARA

Marine GIARD
Médecin hygiéniste
Adjointe

Charlotte MOREAU
Pharmacien hygiéniste
PRIMO

David NARBÉY
Pharmacien hygiéniste

Paraméd.

Nadine KHOUIDER
Cadre hygiéniste

Karen VANCOETSEM
Cadre biohygiéniste

Aurélie GALLIOT
Infirmière hygiéniste

Caroline AUREL
Cadre hygiéniste

Support

Anaïs MACHUT
Biostatisticienne

Nathalie SANLAVILL
Documentaliste / TIC

Joëlle BAFFIE
Assistante

Clermont-Ferrand

Olivier BAUD
Médecin hygiéniste
Adjoint

Fernanda DUPLATRE
Infirmière hygiéniste

Nathalie MONTMANEIX
Infirmière hygiéniste

Marie-Christine NOZI
Assistante

Teamwork

Antibiothérapie

RECOMMANDER LES BONNES PRATIQUES

SYNTHÈSE

Choix et durées d'antibiothérapie préconisées dans les infections bactériennes courantes

Validée par le Collège le 15 juillet 2021

Mise à jour 11 juillet 2024

Cette fiche de synthèse mentionne l'antibiothérapie de 1^{ère} intention et sa durée préconisée dans les infections bactériennes courantes de ville.

- Infections urinaires de la femme
- Infections ORL de l'enfant et de l'adulte
- Infections bactériennes cutanées
- Infection par *Helicobacter pylori* chez l'adulte
- Diverticulite aiguë sigmoïdienne non compliquée
- Urétrites et cervicites non compliquées
- Infections respiratoires basses **[2024]** : Coqueluche, Exacerbation de BPCO (EABPCO)

Des fiches détaillées et complètes par infection bactérienne sont disponibles sur www.has-sante.fr

[reco360 synthese durees antibiotherapies coi 2021 07 15 v2.pdf \(has-sante.fr\)](#)

Réévaluation de l'antibiothérapie en Ehpad à 48-72h

CHECK-LIST PARAMÉDICALE RÉÉVALUATION DE L'ANTIBIOTHÉRAPIE À 48-72H

TOUTE ANTI-BIOTHÉRAPIE DOIT ÊTRE RÉÉVALUÉE À 48H – 72H POUR ADAPTER LE TRAITEMENT AU DIAGNOSTIC CLINIQUE ET À LA DOCUMENTATION MICROBIOLOGIQUE ÉVENTUELLE, ET DIMINUER LE RISQUE D'ÉMERGENCE DE RÉSISTANCE BACTÉRIENNE. LA COLLABORATION PARAMÉDICALE EST INDISPENSABLE POUR S'ASSURER DE L'EFFICACITÉ, DE LA TOLÉRANCE, ET DE LA BONNE OBSERVANCE DE L'ANTIBIOTHÉRAPIE. DESTINÉE AUX PARAMÉDICAUX, CETTE FICHE, À COMMUNIQUER AU MÉDECIN, PERMET D'AMÉLIORER LA RÉÉVALUATION DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE ET DE LA TRACER DANS LE DOSSIER DU PATIENT.

DATE DE RÉÉVALUATION: ____/____/____	IDENTITÉ IDE RÉALISANT LE BILAN DE RÉÉVALUATION :	IDENTITÉ DU RÉSIDENT (COLLER ÉTIQUETTE):
JO (INITIATION TRAITEMENT) :	UNITÉ DE SOINS :	NOM/PRÉNOM :
MÉDECIN CONTACTÉ :	TÉLÉPHONE :	DATE DE NAISSANCE : ____/____/____
TÉLÉPHONE :		N° DE RÉSIDENT :
		POIDS : _____KG
		FONCTION RÉNALE (EDFG-CLAIRANCE) :

PRÉSENCE DE SIGNES POTENTIELS DE GRAVITÉ ?

(Si au moins 1 signe coché, selon protocole d'urgence de l'EHPAD: Avertir le médecin)

☐ T° > 38°	☐ FR ≥ 30/min
☐ PAS ≤ 110 mmHg	☐ Altération de la conscience
☐ FC > 110 bpm	☐ Anurie ou diminution de la diurèse

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE:

→ DCI:	→ Durée initiale prescrite:
→ Voie d'administration:	→ Indication initiale:
→ Posologie:	

Résultat microbiologiques ?

OBSERVANCE ET TOLÉRANCE :

☐ Y a-t-il eu un ou plusieurs oublis ou saut de prise ?	OUI	NON
☐ Y a-t-il eu des difficultés à l'administration ?	OUI	NON
☐ Si perfusion IV ou SC : Bonne tolérance locale ?	OUI	NON
Si non, préciser:		
☐ Des effets indésirables ont été observés ?	OUI	NON
Si oui, préciser lesquels et avertir le médecin		

LES SYMPTÔMES INITIAUX SE SONT-ILS AMÉLIORÉS ?

Amélioration Stabilité/ Persistance des symptômes Dégradation

SI PERSISTANCE OU DÉGRADATION, QUELS SONT LES SIGNES CLINIQUES ? (AVERTIR LE MÉDECIN).

- Fièvre Troubles du comportement Fatigue Céphalées Douleurs articulaires Douleurs musculaires

Signes digestifs :

- Nausées Vomissements Diarrhées Douleurs abdominales Ne mange plus Ne boit plus

Signes respiratoires :

- Toux Dyspnée Essoufflement Douleur thoracique Crachats Encombrement Troubles de déglutition

Signes urinaires :

- Brûlures mictionnelles Difficultés à uriner Besoin fréquent d'uriner Douleur lombaire

Signes cutanés :

- Rougeur Chaleur Douleur Œdème

Peut-on simplifier l'antibiothérapie? Durée, voie d'abord ? Arrêt d'une association d'antibiotique ?

LES ACTUS DU CRATB

POUR : La médecine de ville Les établissements de santé Les établissements médico-sociaux

JOURNÉE ANNUELLE RÉGIONALE 2024

La journée annuelle du bon usage des antibiotiques aura lieu **mardi 26 novembre** à Lyon (Espaces Part-Dieu).
Marquez vos agendas !
D'autres informations suivront...

ACTUALISATION DES RÈGLES DE BUA

Ces recommandations de bon usage des antibiotiques pour les **professionnels de santé, patients et parents** ont été élaborées par l'ANSM en lien avec de nombreuses sociétés savantes, groupes et associations en santé.

CALENDRIER DES VACCINATIONS 2024

RÉSULTATS SPARES ET PRIMO

Cette année, nous avons ajouté un paragraphe d'indicateurs régionaux proposés par le CPIas et le CRATB ARA, avec des objectifs à atteindre en 2025, dans ces deux **rapports de surveillance de la consommation des antibiotiques et des résistances bactériennes** :

- en Ehpad en 2022 en région ARA

3^{ème} Journée Régionale
Bon usage des antibiotiques / Antibiorésistance
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Mardi 26 Novembre 2024 - Lyon
Espaces Part-Dieu

THÉMATIQUES

- Les dernières actualités
- Antibiorésistance chez l'animal : impact sur l'homme
- Épidémie à *Mycoplasma pneumoniae* : quelles leçons ?
- Antibiotiques sous-cutanés
- Recommandations endocardites
- Allergies aux β-lactamines
- Rôle de l'IDE dans le BUA
- Évaluation qualitative de l'antibiothérapie : quelles pistes ?

CRATB omed-t CPIas

Nous vous attendons nombreux !

Newsletter CRATB

<https://cratb-aura.fr/>

Vaccination

RECOMMANDER

DES STRATÉGIES DE SANTÉ PUBLIQUE

RECOMMANDATION

**Stratégie de
vaccination contre
les infections
invasives à
méningocoques**

Révision de la stratégie contre les
sérogroupes ACWY et B

La HAS recommande contre les infections invasives à méningocoques :

- la vaccination **tétravalente (ACWY)** chez tous les adolescents selon un schéma à une dose administrée **entre 11 et 14 ans**, indépendamment de leur statut vaccinal
- **un rattrapage vaccinal chez les 15-24 ans**

À noter que l'obligation vaccinale contre les sérogroupes ACWY et B chez le nourrisson entrera en vigueur le 1er janvier 2025 après la publication des textes réglementaires.

Mars 2024

[Haute Autorité de Santé - Infections invasives à méningocoques : des recommandations vaccinales actualisées \(has-sante.fr\)](https://www.has-sante.fr/fr/maladies-infectieuses/infections-invasives-a-meningocoques/actualites/2024-03-01-recommandations-vaccinales-actualisees)

RECOMMANDER

DES STRATÉGIES DE SANTÉ PUBLIQUE

RECOMMANDATION

Recommandations vaccinales contre le zona. Place du vaccin Shingrix

Validé par le Collège le 29 février 2024

La HAS préconise la vaccination contre le zona :

- des **adultes immunocompétents de 65 ans et plus**,
préférentiellement avec le vaccin Shingrix®
- des **personnes de 18 ans et plus dont le système immunitaire est défaillant** avec le vaccin Shingrix,
- Il est **possible d'administrer le vaccin Shingrix** de façon **simultanée** avec un vaccin inactivé contre **la grippe saisonnière** sur des sites d'injection différents.

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=99c689d19422c300fc2a697a09a639863b73fb2c

Stratégie vaccinale de prévention des infections par le VRS chez l'adulte âgé de 60 ans et plus

La HAS recommande (Juillet 2024):

- **d'intégrer les vaccins Arexvy et Abrysvo**, nouvellement autorisés, dans la stratégie de prévention des infections par **le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les personnes âgées**.
- Une vaccination des plus vulnérables, avec l'un ou l'autre de ces vaccins :
 - les **personnes âgées de 75 ans**
 - les **personnes âgées de 65 ans et plus présentant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques** particulièrement une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou cardiaques chroniques (notamment une insuffisance cardiaque)
- La **vaccination contre le VRS** peut être réalisée de **manière concomitante à celle contre la grippe**

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3460918/fr/strategie-vaccinale-de-prevention-des-infections-par-le-vrs-chez-l-adulte-age-de-60-ans-et-plus

Chiffres clés

Quels vaccins en France ?

PREVENAR 13 [®] VPC 13	VAXNEUVANCE [®] VPC 15	PREVENAR 20 [®] VPC 20	PNEUMOVAX [®] VPP 23
Vaccins inactivés polysodiques Conservation entre + 2 °C et + 8 °C Ne pas congeler			
13 sérotypes Conjugué IM A partir de 2 mois	15 sérotypes Conjugué IM A partir de 6 semaines	20 sérotypes Conjugué IM A partir de 18 ans	23 sérotypes Non conjugué IM ou SC A partir de 2 ans

Schémas vaccinaux

Pour les nourrissons < 2 ans
Nourrissons de 2 à 6 mois : VPC 15 ou VPC 13 à M2, M4, et un rappel à M11
Nourrissons de 7 à 11 mois non vaccinés antérieurement : 2 doses de VPC 15 ou VPC 13 à 2 mois d'intervalle, et un rappel 1 an plus tard
Nourrissons de 12 à 23 mois non vaccinés antérieurement : 2 doses de VPC 15 ou VPC 13 à au moins 2 mois d'intervalle
Prématurés et nourrissons à risque élevé d'IP
VPC 15 ou VPC 13 à M2, M3, M4 et un rappel à M11
Enfants à risque élevé d'IP de 2 ans à moins de 5 ans
Si non vaccinés antérieurement avec un vaccin conjugué : 2 doses de VPC 15 ou VPC 13 à 2 mois d'intervalle suivies d'1 dose de VPP 23 au moins 2 mois après la 2 ^{ème} dose de VPC 15 ou VPC 13
Si vaccination avant 24 mois avec vaccin VPC 13 ou VPC15 : 1 dose unique de VPP 23 au moins 2 mois après la précédente dose de vaccin conjugué

Enfants de plus de 5 ans, à risque élevé d'IP, quel que soit le risque :
Si non vaccination antérieure : 1 dose de VPC 15 ou VPC 13 suivies d'1 dose de VPP 23 au moins 2 mois après la dose de vaccin conjugué
Si vaccination antérieure > 1 an avec VPP 23 : 1 dose de VPC 15 ou VPC 13 1 dose VPP 23 possible avec un délai de 5 ans minimum par rapport à la dernière dose de VPP 23
Si vaccination par schéma VPC 13 - VPP 23 ou VPC 15 - VPP 23 : 1 dose de VPP 23 possible en respectant un délai de 5 ans après la précédente injection de ce même vaccin
Adultes à partir de 18 ans, à risque élevé d'IP
Non antérieurement vacciné ou vaccination antérieure > 1 an avec une seule dose de VPC 13 ou VPP 23 : 1 dose unique de VPC 20
Si vaccination par ancien schéma VPC 13 - VPP 23 : 1 dose unique de VPC 20 après un délais de 5 ans minimum suivant la dernière injection

Recommandations particulières	Recommandations générales
Patients immunodéprimés Asplénique Déficiants immunitaires Patients VIH+ Hémapathies malignes Cancers solides Transplantés ou en attente Immunosuppresseurs, corticoïdes au long terme ou biothérapies Syndrome néphrotique Greffés de cellules souches hématopoïétiques	Patients non immunodéprimés avec maladie chronique Brèche ostéoméningé Cardiopathies BPCO Asthme Insuffisance rénale Diabète non équilibré Hépatopathies chroniques

Vaccination contre les infections à pneumocoque

- Vaccin conjugué 15-valent Vaxneuvance[®] → les nourrissons et les personnes âgées de moins de 18 ans.
- Vaxneuvance[®] et Prevenar13[®] pourront être utilisés indifféremment dans le cadre de la vaccination obligatoire des nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018.
- **Chez l'adulte** : le **nouveau vaccin conjugué 20-valent Prevenar20[®]** (schéma vaccinal à une dose unique) est à utiliser de manière préférentielle dans la stratégie de prévention des infections à pneumocoque chez les personnes âgées de 18 ans et plus.

<https://www.omedit-auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/85509/download?inline>

DATE : 05/04/2024

REFERENCE : DGS-URGENT N°2024_04

TITRE : VIGILANCE RENFORCÉE DANS LE CADRE DE LA RECRUESCENCE DE LA ROUGEOLE EN EUROPE ET EN FRANCE

Professionnels ciblés

Tous les professionnels Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)

☐ Chirurgien-dentiste	☐ Audioprothésiste	☐ Podo-Orthésiste
☐ Ergothérapeute	☐ Autre professionnel de santé	☐ Sage-femme
☐ Manipulateur ERM	☐ Orthopédiste-Orthésiste	☐ Diététicien
☐ Médecin-autre spécialiste	☐ Pédiatre-Podologue	☐ Pharmacien
☐ Infirmier	☐ Opticien-Lunetier	☐ Psychomotricien
☐ Masseur Kinésithérapeute	☐ Orthoptiste	☐ Orthoprothésiste
☐ Médecin généraliste	☐ Orthophoniste	☐ Technicien de laboratoire médical

Zone géographique

National Territorial

Régions	Départements

Mesdames, Messieurs,

La Direction Générale de la santé (DGS) appelle à la **vigilance renforcée de l'ensemble des professionnels de santé concernant la détection précoce de la rougeole et la mise en œuvre des mesures de prévention appropriées en raison d'une augmentation récente du nombre de cas en France (bulletin Santé publique France)** et sur le continent européen.

La situation actuelle, fait craindre, au vu de la forte contagiosité de la maladie, une diffusion plus large sur le territoire national au cours des mois à venir et aussi à l'approche des grands rassemblements de l'été (Jeux Olympiques 2024).

A. Recommandations sanitaires

- Le diagnostic clinique de la rougeole doit être évoqué devant tout patient, quel que soit son statut vaccinal, en présence d'une fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ associée à une éruption maculo-papuleuse et d'au moins un des signes suivants : conjonctivite, rhinite, toux, signe de Koplik. Les patients sont contagieux 5 jours avant l'apparition de l'éruption ;
- Une confirmation biologique est indispensable **préférentiellement par prélèvement oropharyngé et amplification génique par RT-PCR** l'ARN viral étant détectable de quelques jours avant le début de l'éruption jusqu'à environ 10

Fiche Repère

Rougeole en établissement de santé ou établissement médico-social

La rougeole en quelques mots

- **Maladie virale** strictement humaine, immunisante, très contagieuse (R0 15 - 20)
 - **Transmission**
 - o aérienne et par sécrétions rhino-pharyngées
 - o de 5 jours avant à 5 jours après le début de l'éruption
 - **Incubation** : 10 à 14 jours en moyenne
 - **Phase d'invasion** : 2 à 4 jours
 - o fièvre d'apparition progressive
 - o catarrhe oculoro-respiratoire (conjonctivite, larmolement, rhinite, toux), asthénie, signe de Koplik inconstant
 - **Phase d'éruption**
 - o débute au niveau de la tête (derrière les oreilles) 14j après le contage (7 à 18j)
 - o maculo-papuleuse, descendante en 3 à 4 jours, d'un seul tenant
 - o disparaissant au bout d'une semaine (desquamation possible)
 - o fièvre progressivement décroissance avec apyrexie au 3^{ème} ou 4^{ème} jour de l'éruption
 - **Complications** : pneumonie, encéphalite (chez ≤ 5 ans et ≥ 20 ans), formes graves chez les immunodéprimés
- Calendrier vaccinal, vaccin trivalent rougeole oreillons rubéole** → **sauf contre-indication aux vaccins vivants**
- Nés à partir du 01/01/2018 : vaccination obligatoire à 2 doses, la 1^{ère} à 12 mois, la 2^{ème} entre 16 et 18 mois
 - Nés à partir de 1980 : recommandation, chacun devrait avoir reçu 2 doses avec un délai minimum d'1 mois entre les 2 doses, ou 3 doses pour les personnes ayant initié leur vaccination avant l'âge de 12 mois
 - Nés avant 1980 : professionnels de santé ou petite enfance sans antécédent connu de rougeole ou rubéole : 1 dose
- NB : si les antécédents de vaccination ou de maladie sont incertains, vacciner sans contrôle sérologique préalable.*

Définitions et signalement

- **Cas**
 - o Cas clinique : fièvre $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ associée à une éruption maculo-papuleuse et avec au moins un des signes suivants : conjonctivite, coryza, toux, signe de Koplik
 - o Cas confirmé
 - Biologiquement
 - en l'absence de vaccination dans les 2 mois précédents : détection d'IgM spécifiques dans la salive ou le sérum et/ou séroconversion ou multiplication par au moins 4 du titre des IgG
 - et/ou PCR positive
 - et/ou culture positive
 - épidémiologiquement : cas clinique ayant été en contact avec un cas confirmé dans les 7 à 18 jours avant le début de l'éruption
- **Sujet contact** : toute personne ayant côtoyé le malade entre 5 jours avant et 5 jours après le début de l'éruption
 - o l'entourage familial (personnes de la famille vivant sous le même toit)
 - o personne ayant fréquenté de manière concomitante les mêmes locaux que le malade pendant plus de 15 mn ou avec un contact avec le malade en face à face
 - o personne ayant séjourné dans une pièce occupée par le malade jusqu'à 2h après le départ de ce dernier
- **Déclaration obligatoire sans délai à l'ARS** tél : 0 802 32 42 62 @ : ars69-alerte@ars-sante.fr cerfa
- **Signalement sans délai à l'ARS et au CPIAS via e-SIN** pour une rougeole nosocomiale

Fiche Repère Rougeole • CPIAS ARA • 24 avril 2024

Confirmation biologique

- **Prélèvements** : oropharyngé (préférentiellement), rhinopharyngé, salivaires
- **Analyses**
 - o RT-PCR (préférentiellement) avec génotypage au CNR
 - o Culture
 - o sérologie (IgM ou séroconversion), délai de réponse

Diagnostic de la rougeole
Quels échantillons? Quand prélever?

Sérum	Écouvillonnage nasopharyngé	Urines
<ul style="list-style-type: none"> • RT-PCR • IgM sérique • Test à anticorps sérologiques (rubéolite) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur milieu de transport • RT-PCR • RT-PCR génotypage, culture (recherche) 	<ul style="list-style-type: none"> • RT-PCR • RT-PCR génotypage, culture (recherche)

Fiche Repère Rougeole • CPIAS ARA • 24 avril 2024

Vaccination contre la Rougeole

Afin de leur assurer une meilleure protection, une dose additionnelle de ROR est recommandée chez les personnes nées après 1980 et qui ont reçu une première vaccination avant l'âge d'un an.

DATE : 13/08/2024

RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2024_11

TITRE : ÉPIDÉMIE DE COQUELUCHE : AVIS HAS ET HCSP

Professionnels ciblés

Tous les professionnels

Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)

Chirurgien-dentiste

Audioprothésiste

Podo-Orthésiste

Ergothérapeute

Autre professionnel de santé

Sage-femme

Manipulateur ERM

Orthopédiste-Orthésiste

Diététicien

Médecin-autre spécialiste

Pédiatre-Podologue

Pharmacien

Infirmier

Opticien-Lunetier

Psychomotricien

Masseur Kinésithérapeute

Orthoptiste

Orthoprothésiste

Médecin généraliste

Orthophoniste

Technicien de laboratoire médical

Zone géographique

National

Territorial

Mesdames, Messieurs,

Dans les suites du message [DGS-Urgent n°2024_08](#) diffusé le 7 juin 2024 vous informant de l'intensification de la circulation de la bactérie *Bordetella pertussis* en France et en Europe et rappelant l'importance de la vaccination des femmes enceintes à partir du 2^{ème} trimestre, nous souhaitons vous faire part de la publication de différents documents :

1/ [Point épidémiologique de Santé publique France au 29 juillet 2024](#)

L'ensemble des indicateurs de surveillance de la coqueluche suivis par Santé publique France en ville et à l'hôpital montre que l'épidémie de coqueluche sur le territoire national, observée depuis le début de l'année 2024, s'est intensifiée sur les derniers mois.

En termes de décès depuis début 2024, un total provisoire de 28 décès a été rapporté, dont 20 enfants (18 âgés de moins de 1 an) et huit adultes (âgés de 51 à 86 ans mais dont la coqueluche n'était pas indiquée comme première cause de décès). Le plus grand nombre de décès a été observé en juillet avec 9 décès.

L'ampleur du pic et la durée de ce cycle épidémique ne sont pas prévisibles et si certains indicateurs semblent être à la baisse depuis le début du mois de juillet, l'interprétation doit être prudente car les données du mois de juillet ne sont pas encore consolidées.

2/ [Avis de la Haute Autorité de santé \(HAS\) du 22 juillet 2024 relatif à la stratégie de vaccination contre la coqueluche dans le contexte épidémique de 2024 – Rappel vaccinal des professionnels au contact des personnes à risque de forme grave](#)

Face à la circulation de la coqueluche sur le territoire, la stratégie la plus efficace reste la vaccination anticoquelucheuse, telle que prévue au calendrier vaccinal :

PROTOCOLE COQUELUCHE EN ESMS

OBJECTIFS

- Savoir diagnostiquer le 1^{er} cas de coqueluche afin d'éviter ou de limiter l'impact de la survenue de cas secondaires.
- Connaître les mesures de contrôle, de gestion et d'hygiène à mettre en place.
- Inciter au respect du calendrier vaccinal des professionnels et rattraper une vaccination incomplète.

PRÉAMBULE

La coqueluche, infection bactérienne due à *Bordetella pertussis* ou *parapertussis*, est une maladie contagieuse, potentiellement grave chez les sujets à haut risque.

Elle se transmet par contamination directe, à partir des sécrétions respiratoires (gouttelettes). Les manifestations sont liées à la production d'une toxine.

Les sujets à risque sont ceux susceptibles de développer une forme grave ou en contact avec des sujets fragiles :

- résidents insuffisants respiratoires, résidents immuno-déprimés,
- soignants ou visiteurs non vaccinés ayant des contacts avec des nouveau-nés ou nourrissons non protégés par la vaccination (< 6 mois, non vacciné ou incomplet),
- nourrissons "visiteurs" en cours de vaccination ou non vaccinés
- soignantes ou visiteuses enceintes non vaccinées.

SOMMAIRE

✦ DIAGNOSTICS CLINIQUE ET BIOLOGIQUE.....	P. 2
✦ PRISE EN CHARGE DES CAS SYMPTOMATIQUES.....	P. 2
✦ PRISE EN CHARGE DES SUJETS CONTACTS.....	P. 3
✦ AUTRES MESURES DE GESTION.....	P. 4
✦ ANNEXES.....	P. 5

[Stratégie de vaccination contre la coqueluche dans le contexte épidémique de 2024 \(has-sante.fr\)](#)

[Tuto Cpias et CRATB Nouvelle Aquitaine : https://www.youtube.com/watch?v=9e2eY0TBNNk](https://www.youtube.com/watch?v=9e2eY0TBNNk)

DGS-URGENT

DATE : 04/09/2024

RÉFÉRENCE : DGS-URGENT N°2024_14

TITRE : MPOX : RAPPEL DES CONDUITES A TENIR ET NOUVEAUX AVIS DE LA HAS ET DU HCSP SUR LA VACCINATION

Professionnels ciblés

Tous les professionnels

Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)

☐ Chirurgien-dentiste	☐ Audioprothésiste	☐ Podo-Orthésiste
☐ Ergothérapeute	☐ Autre professionnel de santé	☐ Sage-femme
☐ Manipulateur ERM	☐ Orthopédiste-Orthésiste	☐ Diététicien
☒ Médecin-autre spécialiste	☐ Pédiatre-Podologue	☒ Pharmacien
☒ Infirmier	☐ Opticien-Lunetier	☐ Psychomotricien
☐ Masseur Kinésithérapeute	☐ Orthoptiste	☐ Orthoprothésiste
☒ Médecin généraliste	☐ Orthophoniste	☐ Technicien de laboratoire médical

Zone géographique

National

Territorial

Mesdames, Messieurs,

Le 14 août 2024, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la **recrudescence actuelle du mpxx dans les pays d'Afrique centrale constituait une Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI)**. Le principal foyer de transmission identifié se situe en **République Démocratique du Congo (RDC)**, totalisant plus de 95% des cas, avec majoritairement des souches appartenant au clade I. Des cas confirmés d'infection par ce clade, et notamment par le sous clade Ib, ont aussi été signalés dans des pays voisins de la RDC tels que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et le Kenya. Le clade I serait plus virulent que le clade II responsable de l'épidémie de 2022. En Europe, le risque de propagation du virus de clade I est considéré comme faible par l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Aucun cas de clade Ib n'a été recensé en France à ce jour, mais il n'est pas à exclure le signalement de cas sporadiques dans les prochains mois. En dehors du continent africain, la Suède et la Thaïlande ont signalé la survenue d'un cas de mpxx de sous-clade 1b sur leur territoire respectivement les 15 et 22 août.

<https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/alerte-monkeypox>

Infection par le virus Mpxx

Information et organisation en région ARA

	Recommandations nationales	Organisation en ARA
Préalable	<ul style="list-style-type: none"> • Orthopoxvirus • Transmission inter-humaine <ul style="list-style-type: none"> . contact direct avec lésions cutanées, liquides biologiques ou muqueuses (contact sexuel) . exposition à des sécrétions respiratoires . transmission transplacentaire mère-enfant . contact indirect (objets/linge contaminés) • Précautions complémentaires pour les soignants de 1^{ère} ligne : Contact + Air - COREB - 17.08.24 (harmonisation en cours avec la SF2H - 2023) • Le point sur le virus - Ministère - 13.08.24 • Données épidémiologiques - SpF 	<ul style="list-style-type: none"> • Etablissement de santé de référence (ESR) en ARA : Hospices Civils de Lyon (HCL) • Etablissements avec infectiologues référents : <ul style="list-style-type: none"> . avec astreinte nuit et week-end : 4 CHU + CH de Chambéry (CHMS) et Annecy (CHANGE) . autres CH (hors astreinte nuit/week-end) : CH de Annemasse (CHAL), Bourg-en-B., Valence, Vichy, et Villefranche et 2 CeGIDD à Lyon
Définitions / classement	<ul style="list-style-type: none"> • Définitions des cas et conduites à tenir - SpF - 20.04.23 	Devant toute suspicion, le SAMU ou un médecin contacte l'infectiologue référent et classe le cas
Formation / information	<ul style="list-style-type: none"> • Formation des professionnels - COREB - 20.08.22 • Info patient - COREB - 17.08.24 • Info grand public Flyer - SpF - 15.07.22 • N° vert (anonyme confidentiel) : 0 801 90 80 69 	<ul style="list-style-type: none"> • Relais par service prévention et promotion de la santé • Site sexosafe
Diagnostic	<ul style="list-style-type: none"> • Aide au diagnostic dermatologique - COREB - 09.06.22 • Procédure opérationnelle de prélèvement - COREB 17.08.24 • Gestion des prélèvements biologiques - SFM - 11.06.22 	<ul style="list-style-type: none"> • Prélèvement : par tout laboratoire de biologie médicale (LBM) qui le propose et dans les CeGIDD • Analyse : <ul style="list-style-type: none"> . Par LBM ou envoi au laboratoire d'un des 4 CHU . HCL : RT-PCR permettant de distinguer les clades . Autres CHU : PCR générique Orthopoxvirus, si positive, envoi au CNR
Prise en charge du cas	<ul style="list-style-type: none"> • Prise en charge en 1^{ère} ligne - COREB - 17.08.24 • PEC en médecine générale - Collège MG - 13.07.22 • Prise en charge d'un cas (en ES) - HCSP - 24.05.22 • Prise en charge en ville ou collectivité, personnes à risque de forme grave - HCSP - 09.06.22 • Evolution prise en charge - DGS-Urgent - 08.07.22 	<ul style="list-style-type: none"> • L'infectiologue référent organise la prise en charge en lien avec le médecin déclarant et le SAMU : • Forme non grave : isolement à domicile, suivi régulier jusqu'à guérison • Forme grave : hospitalisation à l'ESR, hôpital de la Croix-Rousse, SMIT en 1^{ère} intention
Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Forme non grave : transport personnel, à défaut ambulance (éviter les transports en commun) • Forme grave : SMUR 	Transport en ambulance privée – HCL – 26.05.22
Prévention	<ul style="list-style-type: none"> • Mesures de prévention - HCSP - 08/07/2022 • Prévention PSL greffons... - HCSP - 09.06.22 • Transmission aux animaux - ANSES - 10.06.22 • Transmission par l'alimentation - ANSES - 05.07.22 	
Signalement	<ul style="list-style-type: none"> • Cas probables ou confirmés : • Fiche Cerfa de DO des Orthopoxvirus 	
Investigations		<ul style="list-style-type: none"> • Investigation du cas : ARS • Contact tracing et suivi des contacts : <ul style="list-style-type: none"> . communautaires : ARS . hospitaliers : SST, EOH avec l'appui du CPIAS
Vaccination & Traitements	<ul style="list-style-type: none"> • Vacc. préexposition et réactive - HAS - 29.08.24 • Vacc. des contacts - DGS-Urgent 58 - 03.06.22 • Vacc. primo-vaccinés et enfants - DGS-Urgent 63 - 21.06.22 • Vaccins et traitements - Info ANSM - 04.07.22 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccination des contacts à risque : proposition par ARS, selon calendrier vaccinal • Commande à l'ARS, pôle sécurité des activités de soins et de vigilance, par courriel (stock d'Etat) • Organisation de la vaccination dans l'ES du contact. • Vaccination élargie : cf. liste des centres en ARA
Autres liens	<ul style="list-style-type: none"> • Répia • Ministère de la santé • CNR Orthopoxvirus 	<ul style="list-style-type: none"> • ARS ARA • CPIAS ARA

05/09/2024

Campagne de vaccination 2024
Grippe + Covid-19

15 octobre 2024

	Covid		Grippe saisonnière
	6 mois - 4 ans	≥ 5 ans	
Période	A partir du 15 octobre 2024		
Recommandations Calendrier vaccinal pages 11 et 16	<ul style="list-style-type: none"> Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ou en contact régulier avec des personnes à risque de forme grave ≥ 65 ans Patients d'USLD Personnes immunodéprimées Femmes enceintes, quel que soit le trimestre ≥ 6 mois atteints de comorbidités ayant un risque plus élevé de forme grave (dont affection chronique, diabète, cancer, IMC ≥ 40) Entourage des personnes immunodéprimées ou vulnérables dont nourrissons < 6 mois présentant des risques de forme grave 		<ul style="list-style-type: none"> Résidents des EMS quel que soit leur âge Professionnels du voyage (navigants, accompagnateurs) Professionnels exposés aux virus influenza porcins/aviaires
Proposition	A toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible		A tous les enfants sans comorbidité de 2 à 17 ans
Avec quel vaccin	<ul style="list-style-type: none"> Vaccin à ARNm monovalent adapté au variant JN.1 : Comirnaty® JN.1 (IM) Pas d'alternative cette année 	<ul style="list-style-type: none"> 5-11 ans : à 10 µg bouchon bleu foncé 6 doses de 0,3 mL / prêt à l'emploi ≥ 12 ans : à 30 µg bouchon gris 6 doses de 0,3 mL / prêt à l'emploi 	<ul style="list-style-type: none"> Vaccin tétravalent Remboursé à partir de 6 mois : <ul style="list-style-type: none"> Fluarix Tetra® (IM) Influvac Tetra® (IM ou SC profonde) Vaxigrip Tetra® (IM ou SC)
Schéma vaccinal	<ul style="list-style-type: none"> Primovaccination <ul style="list-style-type: none"> Sans infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> 3 doses intervalles D1-D2 = 3 sem, D2-D3 = 8 sem Infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> après D1 : intervalle infection-D2 = 3 mois, pas de D3 après D2 : intervalle infection-D3 = 3 mois Rappel (déjà primovacciné ou infecté) <ul style="list-style-type: none"> 1 dose unique en respectant un délai de 6 mois après la dernière infection ou injection 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dose unique (quel que soit le passé vaccinal, y compris en l'absence de vaccination préalable) en respectant un délai après la dernière infection ou injection de : <ul style="list-style-type: none"> 6 mois pour la population cible 3 mois pour les immunodéprimés ou ≥ 80 ans 	<ul style="list-style-type: none"> 6 mois à 8 ans révolus : <ul style="list-style-type: none"> primo-vaccination : 2 doses (0,5ml) D1/D2 à 1 mois rappel : 1 dose (0,5ml) annuelle ≥ 9 ans : <ul style="list-style-type: none"> 1 dose annuelle de 0,5ml

Possibilité de réaliser la vaccination contre la grippe et le Covid **en même temps** (un dans chaque bras, à partir du 15 octobre 2024) **OU en décalé** (pas d'intervalle minimum à respecter entre les 2 injections).

Références : [DGS Urgent "2024_17](#). Campagne de vaccination contre le covid-19 à l'automne 2024
[Calendrier des vaccinations](#) et recommandations vaccinales 2024

<https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/vaccination-des-professionnels-es-et-ems-campagne-2024-2025>

La vaccination

	Vaccination	Pour qui ?	Schéma vaccinal
INFECTIONS RESPIRATOIRES	VRS	≥ 75 ans ou ≥ 65 ans avec comorbidités	Annuel
	Grippe	≥ 65 ans ou avec comorbidités Professionnels en EMS Tous les résidents en EMS	Annuel
	Covid	≥ 65 ans ou avec comorbidités Professionnels en EMS Tous les résidents d'Ehpad	Annuel
	Pneumocoque	≥ 18 ans avec comorbidités	1 x 1 dose
	Zona	≥ 65 ans ou ≥ 18 ans avec déficit immunitaire	1 x 2 doses
	Stratégie de prévention	Pour qui ?	Schéma
	Coqueluche (Vaccination)	Femme enceinte Si mère non vacciné, Entourage du nouveau-né	1 dose 2eme trimestre de grossesse 1 dose Stratégie de cocooning
	Coqueluche (antibioprophylaxie)	Sujet contact de ≥ 80 ans ou présentant des comorbidités	Antibioprophylaxie

Outils en vrac

**OUTILS PRATIQUES
ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
FACE AUX PUNAISES DE LIT**

Cliquer dessus pour les découvrir

- 1** **Fiches pratiques/fiches réflexes pour les professionnels de santé/EOH :**
 - CPias Occitanie : Prise en charge des punaises de lit, mai 2019
 - CPias Ile-de-France : Conduite à tenir en présence de punaises de lit ES et EMS, janvier 2024
 - CPias Pays de la Loire : Punaises de lit, octobre 2018
 - CPias Nouvelle-Aquitaine : Tuto sur les punaises de lit, juin 2019
- 2** **Diaporamas :**
Dr Arezki IZRI, Hôpital Avicenne, Université Sorbonne Paris Nord : Punaises de lit; un nouveau fléau ?
- 3** **Information pour les patients :**
CHU de Nantes, livret d'information : Punaises de lit, recommandations aux personnes infestées, août 2017
- 4** **Experts pour détecter et désinfecter :**
 - Trouver un expert en détection canine de punaises de lit agréé près de chez vous
 - Dites STOP aux punaises de lits : liste des professionnels agréés pour traiter les infestations
- 5** **Centre national d'expertise sur les vecteurs (CNEV) :**
Livret sur les punaises de lit, octobre 2015

Retrouvez-nous ici

CPias
Hauts-de-France

<https://www.cpias.chu-lille.fr/wp-content/uploads/sites/15/2024/05/240524-kit-punaise-de-lit-2129.7.pdf>

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars
Agence Régionale de Santé
Hauts-de-France

**GUIDE
DE PRÉVENTION
ET DE LUTTE CONTRE
LES PUNAISES DE LIT**

DANS
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ET MÉDICO-SOCIAUX

ASSISTANCE PUBLIQUE
HÔPITAUX DE PARIS

https://www.preventioninfection.fr/?jet_download=08a34aeb71b38956b9087d07e07dc63a38f61f4

Hygiène des mains Quels outils choisir ?

Au niveau national

Outils MATIS

Outils PRIMO

*Boîtes personnalisées PRIMO
de distribution*

Au niveau régional

**Boîtes à outils
CPias ARA**

COMMENT CHOISIR ET FAVORISER L'UTILISATION DE LA SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

- Produit réservé à l'usage médical**
 - . Idéalement 4 ingrédients dont 60% d'alcool minimum
 - . Pas de parfum, pas de colorant, pas d'autre produit antiseptique
 - . Contient également des émoullients qui permettent l'hydratation des couches supérieures de la peau et évitent les dermatites professionnelles
- Activités antimicrobiennes prouvées avec normes en vigueur**
 - . Demander le dossier scientifique complet
- Réserver le lavage des mains au savon si les mains sont visuellement souillées**
 - . L'utilisation régulière du savon abîme les mains
 - . Le savon est un détergent qui peut altérer la couche lipidique naturelle de la peau
- Réaliser des essais avec les utilisateurs avant le choix et l'achat d'un produit hydro-alcoolique**
 - . Éviter le choix d'un produit désagréable (sensation de mains qui collent liées à la présence en trop grande quantité d'agent émoullient ou d'épaississant)
- Réfléchir au choix du conditionnement selon les spécificités et emplacements**
 - . Dans les secteurs sensibles, des distributeurs muraux fermés et sécurisés sont généralement mis à disposition par les fabricants
- Veiller à sa mise à disposition en tous lieux et sous différents formats pour faciliter l'utilisation**
 - . Privilégier les flacons poche pour les lieux où la mise à disposition de SHA présente un risque pour les usagers
- L'alcool ne passe pas la barrière cutanée et s'évapore en quelques secondes**
 - . Il n'existe aucun risque d'alcoolémie positive pour l'utilisateur ou la personne soignée

Pour en savoir plus :
Hygiène des mains et soins. SF2H Mars 2018

© CPias ARA - avril 2024

LA SHA, C'EST NOCIF ?

Tu devrais faire attention Manon, il paraît que les solutions hydro-alcooliques c'est nocif. Je l'ai lu sur FacebookK !

C'est certainement un troll, Chantal. Je te DM la dernière affiche du CPias ARA sur ton insta. Tu verras notre SHA, c'est le GOAT ! *

* Traduction : "C'est une fausse information diffusée à grande échelle et destinée à te tromper Chantal. Je transfère de suite la dernière affiche du CPias ARA sur ton compte Instagram. Tu verras que notre SHA c'est ce qu'on fait de mieux !"

Encore 1 professionnel de santé sur 4 estime que la SHA est nocive ou allergisante dans la région ARA
(Quick audit Pulpe friction. Résultats janvier à décembre 2022)

Une SHA choisie en collaboration avec les hygiénistes est :

- ✓ non allergisante (pas de parfum, pas de colorant)
- ✓ non nocive (composition simple, sans composé toxique ou nocif)
- ✓ n'abîme pas les mains (contient des émoullients type glycérine)
- ✓ agréable à utiliser (ne colle pas)
- ✓ active sur les bactéries et virus (normes)

Vous voulez en savoir plus ?
Cliquez ou scannez le QR code

avril 2024

Socit franaise d'Hygine Hospitalire

Avis

Relatif l'valuation de l'intrt du port de gants lors de la ralisation des injections intramusculaires, sous-cutanes et intradermiques

Version du 16/04/2024

la SF2H en partenariat avec le GERES recommande dans le cadre des prcautions standard, de ne pas porter de gants lors de la ralisation d'injections intramusculaires, sous-cutanes et intradermiques, y compris lors de pose de perfusion sous-cutane.

En cas de peau lse du professionnel ou du patient/rsident, le port de gants non striles usage unique reste indiqu comme le prconisent les prcautions standard.

https://www.sf2h.net/k-stock/data/uploads/2024/avis_sf2h_geres_v18avril2024_injectionsim-sc-id.pdf

Tout savoir sur l'éco-nettoyage

Réseau
des **CPias**
Réseau national des Centres d'appui pour la
Prévention des infections associées aux soins

Transition
écologique

WEBINAIRE 1

POURQUOI ALLER VERS L'ÉCO-NETTOYAGE ?

DATE 2 Juillet 2024
14h-15h

- Les bonnes raisons pour passer à l'éco-nettoyage
- Retour d'expérience présentant différentes méthodes comparatives en faveur de l'éco nettoyage
- Retours d'expériences sur la mise en place de l'éco –nettoyage

Normes et désinfectants

Comment s'y retrouver ?

Depuis 15 ans, les aspects normatifs des produits désinfectants ont considérablement évolué. Les dossiers et fiches techniques des fournisseurs sont parfois très complexes et se réfèrent à de nombreuses normes. Dans ces conditions, comment bien choisir son produit désinfectant ?

Le système normatif des désinfectants concerne 3 domaines d'application :

- le domaine médical
- le domaine tertiaire : agro-alimentaire, domestique, industriel, collectivité
- le domaine vétérinaire

Selon le domaine, les micro-organismes testés et les conditions des tests (température, temps de contact, conditions de propreté ou de saleté) sont différents afin d'intégrer les spécificités des lieux ou des activités pour lesquels les produits seront utilisés.

La norme EN 14885 : 2022 « Applications des Normes européennes sur les antiseptiques et désinfectants » spécifie les normes et modalités de réalisation auxquelles les produits doivent se conformer afin de revendiquer une action biocide en fonction du domaine d'activité.

Dans le domaine médical, il est obligatoire de choisir un produit répondant aux normes médicales utilisables en médecine humaine.

Exemple : j'ai besoin d'un produit sporicide pour désinfecter les chambres de patients avec diarrhées à C. difficile. Le produit proposé par le fournisseur répond à la norme de sporicide mais en milieu tertiaire. Ce produit ne sera peut-être pas actif dans les conditions d'utilisation en milieu hospitalier.

Pour la désinfection d'un dispositif médical, le produit à choisir est considéré comme un dispositif médical lui-même et doit avoir le marquage CE.

Avant tout choix d'un produit désinfectant, il convient de consulter les dossiers scientifiques complets (fournis sur demande par les fabricants) afin de vérifier l'adéquation entre les recommandations fournisseurs (fiche produit) et les résultats des normes (temps de contact, dilution, types de micro-organismes testés).

Pour de plus amples informations, consulter le site [Prodhybase®](https://www.prodhybase.fr/) <https://www.prodhybase.fr/>

Base de données sur les produits désinfectants commercialisés en France, dans les secteurs hospitalier, dentaire et les collectivités.

Groupe de travail : Christine Barreto, Marine Glard, Nagham Khanafar, Anne Savey, Karen Vancoetsem

Type de normes : phases et étapes

Les normes sont classées selon une hiérarchie d'activité allant de la plus simple à la plus compliquée. On classe ces normes en fonction d'une phase et d'une étape.

Phase 1 : normes de base

1 ml de suspension de micro-organismes de quantité mesurée mis en contact avec 9 ml de produit pur ou dilué dans un tube à essai. Ces tests réalisés *in vitro* démontrent l'efficacité des produits dans les conditions les plus favorables au produit.

Ces normes sont identiques pour les 3 domaines d'application. Elles ont été reprises dans la dernière version de la EN14885, l'activité désinfectante est conditionnée à la phase 1.

Phase 2 normes d'application

Essais simulant des conditions d'utilisation.

Les tests sont réalisés *in vitro* en présence de substances interférentes, normes moins favorables et se rapprochant des conditions réelles d'utilisation.

Pour revendiquer une action désinfectante, l'obtention d'une norme de phase 2 étape 1 et phase 2 étape 2 est obligatoire.

Phase 2 étape 1

Des micro-organismes sont en suspension dans de l'eau et des substances interférentes afin de simuler un milieu souillé (représentatives de l'utilisation en conditions de propreté ou conditions de saleté au choix du fabricant) : 1 ml de la solution contenant une quantité donnée de micro-organismes en suspension dans ces substances interférentes est mis en contact avec 9 ml de produit pur ou dilué dans un tube à essai.

On parle :

- de conditions de propreté quand l'eau est additionnée de 0,3 g/l d'albumine bovine,
- de conditions de saleté quand l'eau est additionnée de 3 g/l d'albumine bovine et 3ml/l de globules rouges.

En médecine vétérinaire, les conditions de saleté peuvent être encore plus défavorables (10 g/l d'albumine bovine + 10 g/l d'extrait de levures).

Phase 2 étape 2

Micro-organismes mis en suspension dans les conditions de la phase 2 étape 1 mais dont une goutte sera mise à sécher sur un porte germe (plaquette de verre) afin de modéliser un usage.

- Si le produit désinfectant est un produit pour désinfecter des dispositifs médicaux (DM) par immersion, cette plaquette sera mise à tremper dans le désinfectant à la concentration d'utilisation durant un temps donné.
- Si le produit désinfectant est un produit pour désinfecter des surfaces, une goutte de produit à la concentration d'utilisation sera placée sur la plaquette durant un temps donné.
- Si le produit désinfectant imbibé des lingettes, le porte germe sera essuyé avec une lingette (action mécanique), le produit laissé en contact durant un temps donné.

Phase 3 normes en conditions réelles

Pour essais de terrain réalisés en conditions pratiques d'utilisation.

Aucune norme applicable à ce type d'essai n'est actuellement disponible.

Exemple : j'ai besoin de lingettes désinfectantes pour désinfection de petit matériel médical type stéthoscope. Les lingettes devront répondre à des normes de phase 2 étape 1 et des normes phase 2 étape 2 avec action mécanique (essuyage).

Webinaire le
25 novembre
2024

Mon réseau d'eau est contaminé :
check list – argumentaire check list

Prévenir la contamination de l'eau :
check list – argumentaire check list

<https://www.cpias-auvergnerhonealpes.fr/Kit-Eau>

Eaux impropres à la consommation

Webinaire
Février 2025
avec la
participation
de l'ARS

- Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine
- Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l'article R. 1322-94 du code de la santé publique

Respi'Quizz équipe

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Un outil d'évaluation du réseau de prévention des Infections et de l'antibiorésistance

<https://respiquiz.preventioninfection.fr>

Novembre 2023

Objectifs :

Pour les professionnels : auto-évaluer ses pratiques vis-à-vis de la prévention des infections à transmission respiratoire et obtenir des conseils individuels personnalisés

Pour un établissement, un service, un groupe, une équipe :

- Faire l'état des lieux de l'observance des pratiques collectives de prévention des infections respiratoires déclarées par les professionnels
- Obtenir des informations sur les freins aux bonnes pratiques
- Obtenir des informations sur les besoins des professionnels en matière de formation et de communication
- Proposer un plan d'action pour améliorer les pratiques collectives.

[Accueil](#) > [Animation](#) • [Agenda](#) > [Réseaux professionnels](#) > [EMH](#)

EMH - Réseau des équipes mobiles d'hygiène

Le CPias coordonne et anime le réseau des équipes mobiles d'hygiène intervenant auprès des EHPAD de la région.

[Une liste de discussion dédiée aux EMH](#) a été créée pour échanger sur des problématiques particulières aux EMH

Les groupes de travail

Plusieurs groupes de travail se sont constitués afin de bâtir des outils à destination des établissements médico-sociaux.

[Soins d'hygiène bucco-dentaire \(2024\)](#)

[Maîtrise du risque légionelle en ESMS \(2024\)](#)

[Utilisation du guéridon pour les soins de nursing \(2024\)](#)

[Outils déchets pour le secteur médico-social \(2022\)](#)

[Aide au choix et à l'utilisation des produits d'entretien en EHPAD \(2022\)](#)

[Check-list Infection urinaire en EHPAD \(2022\)](#)

[Checklist accident exposition au sang \(2021\)](#)

[Votre patient est porteur/infecté par une BMR/BHRe \(2019\)](#)

[Résident contact ou porteur BHRe. Information aux familles en EHPAD \(2019\)](#)

[Aide décisionnelle pour l'approvisionnement TROD/TDR \(2016\)](#)

Outils clés en main : hygiène bucco-dentaire

Formation des professionnels des établissements médico-sociaux

[Défi Spirale dent'faire](#)

[Affiche mémo Soins bucco-dentaire du résident](#)

[Descriptif d'un atelier pratique, utilisant l'affiche mémo ci-dessus](#)

Evaluation de l'état d'hygiène bucco-dentaire des résidents

[Grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique du résident](#)

[Jeu sérieux La dent d'or, qui vise à maîtriser la grille d'évaluation ci-dessus](#)

Information/sensibilisation des proches du résident

[Flyer Hygiène bucco-dento-prothétique du résident](#)

Spirale Dent'faire
Liens de causes à effets
liés à l'Hygiène Bucco-Dentaire (HBD)

CPias
Auvergne - Rhône - Alpes
Groupe EMILARA HBD

Défi collectif

Comprendre les conséquences d'une mauvaise HBD...

... pour améliorer l'observance des soins

The flyer features a central graphic of a blue spiral tunnel with a dashed line path leading through it. A large, stylized tooth is positioned at the end of the path. The background consists of blue and white wavy lines.

ÉQUIPE MOBILE D'HYGIÈNE

HYGIÈNE BUCCO-DENTO- PROTHÉTIQUE

du résident

Boîte à outils

Cette rubrique recense les outils réalisés par le **CPias Auvergne-Rhône-Alpes** afin d'aider les professionnels de santé des établissements de santé et des établissements médico-sociaux dans la mise en œuvre de la prévention du risque infectieux associé aux soins : **fiches pratiques, mises au point, conduites à tenir, guides techniques, affiches, dépliants, vidéos...**

Tous ces outils sont regroupés par thème (mots-clés ci-dessous).

Filtrer par

Date

Type de document

Thème

Secteur

Mots-clés

Rechercher

Réinitialiser

Résultat de recherche

Kit	Soins d'hygiène bucco-dentaire (28-06-2024)	EMS
Kit	Maîtrise du risque légionelle en ESMS (23-05-2024)	EMS
Kit	Utilisation du guéridon pour les soins de nursing (05-04-2024)	EMS
Fiche pratique	Maîtrise du risque infectieux en EMS, fiches techniques (12-11-2023)	EMS
Kit	Démarche d'Analyse et Maîtrise du Risque Infectieux (DAMRI) (01-09-2023)	EMS
Guide	Antibiothérapie en EHPAD (02-03-2023)	EMS
Kit	Outils déchets pour le secteur médico-social (29-12-2022)	EMS

Maîtrise du risque infectieux en établissement médicosocial

Fiches pratiques proposées par les CPias

Les CPias mettent à votre disposition des fiches thématiques destinées au secteur médico-social utilisables pour vos protocoles. Le format disponible est un fichier Word, vous avez la possibilité d'intégrer le logo de votre structure.
Toute modification souhaitée d'une fiche doit être accompagnée et validée par un hygiéniste.

➤ Chapitre I - Organisation pour la prévention et la maîtrise du risque infectieux

Coordonnées des CPias et Points focaux régionaux ARS (2021)

- Moyens :

Référent médical en hygiène : médecin coordonnateur (2015)

Référent paramédical en hygiène : cadre de santé ou infirmier(e) coordonnatrice ou IDE (2015)

Correspondant en hygiène : IDE ou AS ou Agent de service hôtelier ou logistique (2015)

Missions des Equipes Mobile d'Hygiène (EMH) en Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) (2023)

Projet de convention relative à la prévention des risques infectieux dans les EHPAD (2015)

Rapport d'activité médicale - Volet infectieux (2015)

- Incontournables de la politique de prévention et de maîtrise du risque infectieux :

Précautions standard (2022)

Précautions complémentaires d'hygiène (2015)

Hygiène des mains (2024)

Usage des gants (2022)

Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang (AES) (2024) **Nouveau**

- Formations :

Programme de formation "médicaux" (V1)

Programme de formation "paramédicaux" (V1)

Liste des formations diplômantes en hygiène hospitalière présentées par Inter-région (V1)

- Prévention de l'antibiorésistance :

Utilisation des antibiotiques en ESMS : les incontournables (2021)

Prévention de la transmission des BMR - BHRé en EMS (2023)

➤ Chapitre II - Soins

Prélèvements microbiologiques (2016)

- Infection urinaire

Sondage urinaire (2017)

- Infections cutanées et muqueuses liées aux soins

Antiseptiques (V1)

Hygiène des résidents (2016)

Soins d'hygiène bucco-dentaire (2024) **Nouveau**

Pansement, plaies (2017)

- Abords veineux/sous-cutanés

Cathéter à chambre implantable (CCI) (2017)

Cathéter tunnelisé (2017)

Cathéter veineux périphérique (2019)

Cathéter central à insertion périphérique PICC (2022)

CORRESPONDANT POUR LA
PRÉVENTION ET LA MAÎTRISE DU
RISQUE INFECTIEUX :

ENGAGER, GUIDER & SOUTENIR

Mars 2024

ON RECHERCHE UN
CORRESPONDANT EN HYGIÈNE

LA PRÉVENTION
ET LE CONTRÔLE
DES INFECTIONS (PCI)

**VOUS
INTERESSE.**

VOUS SOUHAITEZ APPORTER VOTRE
EXPÉRIENCE ET VOS COMPÉTENCES
AU SERVICE DE LA PCI :

**FAITES LE SAVOIR
À VOTRE
RESPONSABLE**

**ET REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES
CORESPONDANTS**

CORRESPONDANT EN HYGIÈNE :
UN ACTEUR DE LA PRÉVENTION ET DU CONTRÔLE DE L'INFECTION

**UN CORRESPONDANT
POUR QUOI FAIRE ?**

Sous la responsabilité de votre
responsable hiérarchique, vous êtes le
relai de l'EOH/EMS/RI dans votre
service/secteur.

CE RÔLE AU QUOTIDIEN

- Accompagner les bonnes pratiques, diffusion d'infos vers le service/secteur et remontée d'infos vers l'EOH/EMH/RI, compagnonnage.
- Participer à l'organisation/recueil/restitution de résultats de surveillance/enquête/évaluation.
- Participer au signalement interne.

CE RÔLE SE PRÉPARE

- L'EOH/EMH/RI assure un apport formatif théorique et pratique pour acquérir/consolider vos savoirs, savoir-faire et savoir être dans le domaine de la prévention et contrôle de l'infection :
- présentation de l'organisation de la lutte contre les infections.
 - présentation du rôle et missions du correspondant.
 - renforcement des connaissances sur les précautions standard et complémentaires
 - présentation du dispositif de signalement des infections.

**CE RÔLE EST
ACCOMPAGNÉ**

Vous rejoignez le réseau des correspondants fédéré par l'EOH/EMH/RI. Vous coopérez, partagez et expérimentez dans une perspective commune de prévention et maîtrise du risque infectieux.

**CE QUE LE
CORRESPONDANT
N'EST PAS**

Malgré la préparation avant d'endosser ce rôle, le correspondant ne se substitue pas à l'EOH/EMH/RI.

**DURÉE DE
L'ENGAGEMENT**

Fixée par l'établissement :
ni trop, ni trop peu !
3 ans

Merci d'avoir tenu le coup
jusqu'à la fin!