

GUIDE DE REMPLISSAGE

Enquête sur les difficultés et leviers de mise en place
des mesures de prévention BHRe

Fiche Etablissement sanitaire

ACRONYMES

ABRI	<i>Acinetobacter baumannii</i> résistant à l'imipénème
ARS	Agence Régionale de Santé
BHRe	Bactéries Hautement Résistantes émergentes
CH	Centre Hospitalier
CPias	Centre d'appui pour la Prévention des Infections associées aux soins
Ehpad	Etablissement d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EMH	Equipe Mobile en Hygiène
ENP	Enquête National de Prévalence
EOH	Equipe Opérationnelle d'Hygiène
EPC	Entérobactéries Productrices de Carbapénémases
ERG	Entérocoques Résistants aux Glycopeptides
ES	Etablissement de Santé
ESPIC	Etablissement de santé privé d'intérêt collectif
GHT	Groupement Hospitalier de Territoire
HCSP	Haut Conseil de la Santé Publique
ICSHA	Indicateur de Consommation des Solutions Hydro-Alcoliques
MCO	Médecine-Chirurgie-Obstétrique
PCC	Précautions complémentaires Contact
SMR	Soins Médicaux et de Réadaptation (ex-SSR)

ÉPIDEMIOLOGIE LOCALE : exposition à un épisode BHRe

Combien de [patients porteurs ou infectés](#) (découvertes fortuites ou connus porteurs) par une BHRe votre établissement a-t-il pris en charge en 2023 ?

Il est demandé un nombre de patients et non un nombre d'entrées ou d'hospitalisations. En effet un même patient peut être hospitalisé plusieurs fois durant l'année.

A combien d'[épidémies](#) de BHRe votre établissement a-t-il été confronté en 2023 ?

Une épidémie correspond à au moins deux cas dont un cas secondaire.



GUIDE DE REMPLISSAGE

Enquête sur les difficultés et leviers de mise en place des mesures de prévention BHRé

DÉPISTAGE

La stratégie mise en œuvre dans votre structure consiste-t-elle à dépister systématiquement l'ensemble des patients contacts pris en charge par la même équipe paramédicale qu'un patient porteur excréteur ?

Cochez OUI si l'EOH recommande le dépistage de tous les patients contact dès l'identification d'un patient porteur de BHRé, conformément aux recommandations du HCSP 2019.

Notion de « contacts traceurs »

La notion de « contact traceur » est utilisée dans certaines régions. Elle est entendue comme des contacts définis selon certains critères par l'équipe d'hygiène, et supposés être les plus à risque d'être contaminés par le patient porteur.

REPÉRAGE ET SUIVI DES CAS ET CONTACTS

L'établissement dispose-t-il d'un système de repérage des patients à risque de BHRé à l'admission ?

On entend par système de repérage tout moyen informatique permettant d'identifier un patient présentant un risque d'être porteur de BHRé car il a été par le passé porteur ou contact d'un patient porteur de BHRé.

SERVICES PARTICULIERS

En dialyse, les patients contacts sont-ils dépistés ?

Il est précisé dans la R55 que le secteur de dialyse chronique doit dépister les contacts de patients porteurs de BHRé à intervalle régulier à définir après une analyse de risque en concertation avec l'équipe médicale et l'EOH.