

La perception des infections associées aux soins, du trottoir à l'hôpital

Nina RICHE – Etudiante en L3 Santé Publique
Charlotte MOREAU

Contexte

- **Infections associées aux soins** concernent les **3 secteurs de soins**
- Prévalence des IAS :
 - Etablissements de santé : 5,7 % (2022)
 - Ehpad : 2,4 % (2024)
- Beaucoup de données disponibles mais **quid de la perception ?**
- **Sous-exploration de la perception** du risque infectieux associé aux soins **en population générale**

Objectif

Décrire la **perception du risque infectieux associé aux soins** par la **population générale** et les **usagers du système de santé** dans le contexte **postpandémique** afin **d'adapter les messages de prévention**.



Méthode

- Enquête par **questionnaire anonyme**
- Population générale adulte
- Deux formats :
 - **Auto-questionnaire** en ligne
 - **Questionnaire administré**
- Items :
 - perception du risque infectieux associé aux soins
 - efficacité des mesures de prévention
 - sources d'informations jugées les plus fiables

Perception du risque infectieux associé aux soins

Le CPias Auvergne-Rhône-Alpes mène une étude en population générale sur la perception du risque d'acquérir une infection associée aux soins (IAS) pour adapter les messages de prévention.
Merci d'avoir accepté de répondre à ce questionnaire. Aucune question n'est obligatoire. Il n'y a pas de mauvaises réponses. Vos réponses sont anonymes et les données collectées sont confidentielles.

1. Savez-vous ce qu'est une infection associée aux soins ? ☐ Oui ☐ Non

Explication IAS : une infection associée aux soins est une infection (grippe, infection urinaire, hépatite...) que vous ou un proche pourriez attraper lorsqu'il est soigné pour une autre maladie.

2. Est-ce que vous ou une personne de votre entourage a déjà attrapé une infection au cours d'un soin ? ☐ Oui ☐ Non

3. Sur l'échelle de 1 (nul) à 5 (très important), indiquez le risque d'attraper une infection associée aux soins selon vous.

	1	2	3	4	5
– A l'hôpital					
– En maison de retraite/EPHAD					
– Chez mon médecin généraliste					
– Chez le dentiste					
– Lorsque des soins sont réalisés à domicile					

4. Sur une échelle de 1 (pas peur) à 5 (très peur), indiquez quelle est votre peur d'attraper une infection à l'occasion d'un soin ?

	1	2	3	4	5

5. Sur une échelle de 1 (pas peur) à 5 (très peur), indiquez quelle est votre peur d'attraper les infections suivantes en dehors d'une situation de soin :

	1	2	3	4	5	NSP
– COVID						☐
– Grippe						☐
– Infections génitales et urinaires						☐
– Hépatites B et C						☐
– VIH						☐
– Infections des poumons						☐
– Intoxications alimentaires						☐
– Maladies infantiles pour votre enfant (bronchiolite, Pieds-mains-bouche, ...)						☐

6. Sur une échelle de 1 (pas efficace) à 5 (très efficace) indiquez l'efficacité, selon vous, des actions/éléments suivants pour éviter les infections lors d'un soin.

	1	2	3	4	5
– L'hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique					
– Le port du masque chirurgical					
– La propreté de l'environnement (surface et matériel)					


7. Pensez-vous que les personnes fragiles (âgées, qui ont une maladie chronique, etc.) ont un risque plus important d'attraper une infection associée aux soins (de 1 risque équivalent au reste de la population, à 5 risque très supérieur au reste de la population) ?

	1	2	3	4	5

8. Vous rappelez-vous d'une campagne de prévention (dans le domaine de la santé ou dans un autre domaine) ? ☐ Oui ☐ Non

Résultats : participants

- 706 réponses :
 - 141 questionnaires administrés
 - 565 auto-questionnaires
- Sex ratio (F/H) : 1,9
- Catégories professionnelles :
 - Cadres, profession supérieure : 269, 38,1%
 - Retraités : 189, 26,8%
 - Employés : 112, 15,9%




Résultats : connaissance et crainte

- **547 personnes (77,5 %) savaient ce qu'est une infection associée aux soins (déclaratif)**
- **Plus de la moitié des participants (59,0 %) estimait leur peur d'attraper une infection associée aux soins inférieure à 3 sur une échelle de 1 (pas peur) à 5 (très peur)**


Résultats : acquisition des infections

Perception du risque **d'attraper une infection associée aux soins**
en fonction du **lieu de soin** :





Résultats : acquisition des infections

Perception du risque **d'attraper une infection associée aux soins**
en fonction **du type d'infection et du lieu d'acquisition :**



Résultats : efficacité des mesures



* 1 pas efficace
5 très efficace

Résultats : fiabilité des sources



571
80,9 %



Autorités de santé
Documents, site internet

445
63,0 %



208
29,5 %

Autres sites internet : 97; 13,7 %
Réseaux sociaux : 67; 9,5%

Résultats : campagne de prévention

420 (59,4 %) personnes se souvenaient d'une campagne de prévention




N = 223



N = 85




N = 48




N = 36

Résultats : différences de perception



Comparativement **aux hommes**, **les femmes** :


- Savaient plus souvent **définir une IAS**
- Avaient plus **peur d'attraper une IAS**
- Estimaient le risque **d'attraper une hépatite B ou C, plus fréquente lors de soins**
- Citaient plus souvent comme **fiables les documents/sites des autorités de santé**



Différences selon la classe d'âge :

- Plus de **38 % des 18-29 ans ne savaient pas** ce qu'était **une IAS**
- Les **40-64 ans** avaient **plus peur de contracter une IAS**
- Les **18-29 ans** pensaient que le port du **masque n'était pas efficace**

Résultats : différences de perception



Comparativement aux autres catégories professionnelles, les professionnels de santé :

- Savaient plus souvent **définir l'IAS**
- **Citaient plus souvent la campagne** de prévention pour **l'hygiène des mains**
- **Se rappelaient plus souvent d'une campagne de prévention** qu'ils avaient vue sur **une affiche**

Discussion

- **Notion d'IAS** est **largement connu (77,5 %)** MAIS **perception du risque d'attraper une IAS = modéré (75,0 %)**
- **Différences de perception varient** selon :
 - Le sexe
 - L'âge
 - La catégorie socio-professionnelle
- **Forces :**
 - Enquête réalisée en contexte postpandémique
 - Deux formats de questionnaires
- **Limites :**
 - Biais de sélection (surreprésentation des femmes, des personnes âgées et catégorie socio-pro supérieur
 - Biais de désirabilité sociale (entretiens dirigés)
 - Pas de prise en compte des facteurs de confusion (nombreuses variables)

Conclusion

- **Meilleure connaissance et vigilance accrue des femmes** sur les IAS
- **Jeunes (18-29 ans)** se sentent **moins vulnérables** et sont **septiques** quant à **l'efficacité des mesures de prévention**
- **Réseaux sociaux peu cités** mais rôle dans **la circulation des messages de santé : stratégie de communication** à faire évoluer
- **Réflexions à venir sur des campagnes ciblées**

Remerciements

- Aux 706 participants
- Aux personnes ayant relayé l'information
- À la Pharmacie Duguesclin (Lyon 6),
à la Pharmacie de Tilleuls (Saint Genis-Laval)
et à la Grande Pharmacie des Hôpitaux (Bron)
- À l'ADMR d'Ambérieux en Bugey
- À l'hôpital Henri Gabrielle (Saint Genis-Laval)
- À Nathalie SANLAVILLE
- À Nina RICHE, Charlotte MOREAU, Anaïs MACHUT,
Olivier BAUD, Anne SAVEY et Marine GIARD



Merci pour votre attention

Des questions ?

