


Fiche-repère

Streptococcus pyogenes


Conduite à tenir pour la prévention et le contrôle des infections
à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA / strepto A)



Fiche-repère

Streptococcus pyogenes

Conduite à tenir pour la prévention et le contrôle des infections
à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA / strepto A)



en établissement de santé
en établissement médico-social
en ville


Encadrés roses
Compléments pour les services de maternité

Et un repère pour le nouveau-né



Fiche-repère

Streptococcus pyogenes



Généralités

Définitions

Prévention

CAT devant un ou plusieurs cas d'infections non invasives à SGA

CAT devant un ou plusieurs cas d'infections invasives à SGA (IISGA)


Signalement, alerte, envoi au CNR

Pour conclure..... Fiche Repère à venir

Fiche-repère

Streptococcus pyogenes

Conduite à tenir pour la prévention et le contrôle des infections à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (SGA / strepto A) en établissement de santé en établissement médico-social en ville



V 06/02/2008

Encadrés roses
Compléments pour les services de maternité

Généralités

Définitions

Prévention

Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d'infections non invasives à SGA

Conduite à tenir devant un ou plusieurs cas d'infections invasives à SGA (IISGA)

Signalement, alerte, envoi au CNR

Généralités

Epidémiologie

Une recrudescence des infections à *Streptococcus pyogenes* a été décrite depuis les années 1980, survenant sous forme de bouffées épidémiques, la dernière datant de l'automne 2022, à la faveur de différents clones. Le risque de développer une infection invasive à streptocoque du groupe A (IISGA) est plus important dans les situations suivantes : âge (nouveau-né et plus de 60 ans), post-partum, varicelle évolutive, présence de lésions cutanées étendues, toxicomanie intraveineuse, présence d'une pathologie évolutive (insuffisance cardiaque, diabète), obésité et immunodépression.

Micro-organisme

Caractéristiques

- cocci à Gram positif en paires ou en chaînettes
- plus de 80 sérotypes
- non sporulé, parfois capsulé, immobile, anaérobie facultatif
- fragile aux variations de température et de pH

Réservoir

- principalement pharyngé
- plus rarement cutané ou muqueux (génital, anus)
- peut survivre dans le milieu extérieur et dans quelques aliments

Porteurs asymptomatiques

o Portage pharyngé	5% des adultes et > 20% des enfants d'âge scolaire
o Colonisation cutanée	< 1% des adultes
o Colonisation vaginale	< 1%

