

	Covid		Grippe saisonnière
	6 mois - 4 ans	≥ 5 ans	
Période	A partir du 13 octobre 2026		
Recommandations	- Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ou personnes en contact régulier avec des personnes à risque de forme grave (liste ci-dessous) ≥ 65 ans - Patients séjournant en USLD - Personnes immunodéprimées (y compris transplantés) - Femmes enceintes, quel que soit le trimestre ≥ 6 mois atteints de comorbidités à risque de forme grave (dont affection chronique, diabète, cancer, IMC ≥ 40) - Entourage des personnes immunodéprimées et des enfants et nourrissons < 6 mois présentant des risques de forme grave		
	Calendrier vaccinal pages 11 et 17	- Résidents en EHPAD - Personnes atteintes de troubles psychiatriques, démence, trisomie 21	- Résidents en établissement médico-social, quel que soit l'âge - Patients en soins de suite - Professionnels du voyage (navigants, accompagnateurs) - Professionnels exposés aux virus influenza porcins/aviaires
Proposition	A toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne fait pas partie de la cible		A tous les enfants sans comorbidité de 2 à 17 ans
Avec quel vaccin	- Vaccin à ARNm monovalent spécifique au sous-lignage XFG de la souche Omicron du Sars-Cov-2 : Comirnaty® XFG - Stock état à commander sur la plateforme SpE		- Vaccin trivalent inactivé : - Flucelvax® (≥ 6 mois, IM) Utilisable en cas d'allergie à l'œuf ou aux aminosides - Influvac® (≥ 6 mois, IM ou SC) - Vaxigrip® (≥ 6 mois, IM ou SC) - Vaccin haute dose ou adjuvanté (≥ 65 ans) - Efluelda® hautement dosé (IM) - Fluad® adjuvanté (IM)
	à 10µg bouchon bleu 6 doses de 0,3 ml par flacon, prêt à l'emploi, sans dilution, voie IM	5 ans à 11 ans révolus : à 10 µg bouchon bleu 6 doses de 0,3 ml par flacon, prêt à l'emploi, sans dilution, voie IM ≥ 12 ans : à 30 µg bouchon gris 6 doses de 0,3 ml, prêt à l'emploi	
Schéma vaccinal	Primovaccination - Sans infection durant le schéma vaccinal : 3 doses - intervalles D1-D2 = 3 sem, D2-D3 = 8 sem - Infection durant le schéma vaccinal : - après D1 : intervalle infection-D2 = 3 mois, pas de D3 - après D2 : intervalle infection-D3 = 3 mois Rappel (déjà primovacciné ou infecté) 1 dose unique - en respectant un délai de 6 mois après la dernière infection ou injection	1 dose unique (quel que soit le passé vaccinal, y compris en l'absence de vaccination préalable) - en respectant un délai après la dernière infection ou injection de : 6 mois pour la population cible 3 mois pour les immunodéprimés ou ≥ 80 ans	
			6 mois à 8 ans révolus : - primo-vaccination : 2 doses (0,5 ml) intervalle D1-D2 = 1 mois - rappel : 1 dose (0,5 ml) annuelle ≥ 9 ans : 1 dose (0,5 ml) annuelle

Possibilité de réaliser la vaccination contre la grippe et le Covid **en même temps** (un dans chaque bras) OU **en décalé** (pas d'intervalle minimum à respecter entre les 2 injections).

Références : [DGS Urgent °2026_12](#). Campagne de vaccination contre le covid-19 à l'automne 2026

[Calendrier des vaccinations](#) et recommandations vaccinales 2026