POINT SUR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Santé publique France ARA, Emmanuelle Vaissière

Journée de prévention du risque infectieux chez le nouveau-né, CPIas

21 octobre 2021

PLAN

- 1/ COVID-19 : caractéristiques de la maladie**
- 2/ Situation en région
- 3/ Données chez la femme enceinte et l'enfant

Origine

- 31 décembre 2019 : cas de pneumopathie dans la ville de Wuhan (Chine)
- 7 janvier 2020 : identification d'un nouveau coronavirus => SARS-CoV-2
- 11 mars 2020 : l'OMS déclare l'état de pandémie

Transmission

- Par **aérosols**, en provenance de la bouche et du nez (en suspension dans l'air ambiant)
- Par les **gouttelettes** (dépôt sur les surfaces)
- Par les **mains** en touchant une surface souillée par des gouttelettes
- Excrétion virale maximale juste avant et au début de la maladie

Symptômes

- Durée d'incubation : 3 à 5 jours (max : 14 jours)
- Formes bénignes majoritaires (fièvre ou sensation de fièvre, toux, céphalées, asthénie, agueusie, anosmie, diarrhée, etc)
- Formes graves (≈15%) : difficultés respiratoires nécessitant une hospitalisation

PLAN

1/ COVID-19 : caractéristiques de la maladie

2/ Bilan de l'épidémie en région

3/ Données chez la femme enceinte et l'enfant

BILAN DE L'ÉPIDÉMIE EN 2020 EN AUVERGNE- RHÔNE-ALPES

• Chiffres clés

- > 455 000 personnes testées positives en 2020 (6% de la pop. régionale)

Taux d'incidence des cas confirmés de
COVID-19 en 2020

BILAN DE L'ÉPIDÉMIE EN 2020 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

• Chiffres clés

- > **455 000 personnes testées positives** en 2020 (6% de la pop. régionale)
- > **41 000 hospitalisations** pour COVID-19 en 2020 (8% des cas confirmés), dont environ **6 000 patients admis en soins critiques** (15% des patients hospitalisés)
- ↗ formes graves ↗ âge : 81% des patients hospitalisés âgés de 60 ans et plus

Taux d'incidence des cas confirmés de COVID-19 en 2020

Taux d'hospitalisation pour COVID-19 en 2020

BILAN DE L'ÉPIDÉMIE EN 2020 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

• Chiffres clés

- Mortalité spécifique :

- > 13 000 décès (51% à l'hôpital / 49% en ESMS)

- Mortalité générale :

- Excès significatif de la mortalité observé en 2020 (jusqu'à +95% en S45)

Mortalité toutes causes, toutes classes d'âge confondues (tous âges), jusqu'à la semaine S02 2021, ARA

• Stabilisation des indicateurs

- Situation nettement plus favorable que l'année dernière à la même période
- Facteurs d'incertitude : conditions météorologiques, baisse de l'efficacité vaccinale, observance des gestes barrière, nouveau variant avec échappement vaccinal ...

Couverture vaccinale par classe d'âge (schéma vaccinal complet) en ARA

Au 18 octobre 2021 :

Couverture vaccinale / schéma complet : 86,3%

PLAN

1/ COVID-19 : caractéristiques de la maladie

2/ Bilan de l'épidémie en région

3/ Données chez la femme enceinte et l'enfant

• Contexte

- **Femmes enceintes** au 3^{ème} trimestre de grossesse considérées à risque de forme grave de COVID-19 (avis HCSP et CNGOF)
- Augmentation du risque de détresse maternelle respiratoire sévère, de complications thromboemboliques et cardiovasculaires et de décès des femmes enceintes infectées par le SARS-CoV-2 (*Koy et al, 2021*)
- Risques majorés en présence de co-morbidités (*Romeo et al, 2021*)
- **Pour le bébé** : risque augmenté de mort foétale in utero et de naissance prématurée (*Gurol-Urgency et al, 2021*)
- **Transmission** materno-foétale exceptionnelle, mais risque de transmission au nouveau-né au moment et après l'accouchement (*Peyronnet et al. 2020*)

• Vaccination

- Elargissement de la vaccination aux femmes enceintes à partir du 2^{ème} trimestre de grossesse depuis le 27 mars 2021
- Vaccination recommandée dès le 1^{er} trimestre de grossesse depuis fin juillet 2021

• Plusieurs études de recherche en cours mais absence de système de surveillance spécifique des conséquences maternelle et foétale de l'infection

- **Surveillance des cas de COVID-19 dans les services sentinelles de réanimation :**

- 18 services participants en Auvergne-Rhône-Alpes
- Recueil des caractéristiques épidémiologiques des cas graves de COVID-19 (âge, facteurs de risque, sévérité, évolution clinique)

- **Résultats**

- 1 838 cas signalés, dont **17 femmes enceintes (0,9%)**
- Âge moyen : 34 ans (min : 21 ans; max : 41 ans)
- 12/17 (71%) présentant au moins 1 co-morbidité
- Co-morbidités les plus fréquentes : HTA, diabète, pathologie pulmonaire
- Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA) : 9/17 (53%)
- 4 hospitalisations pour extraction fœtale en urgence
- Aucun décès

COVID-19 : DONNÉES CHEZ LA FEMME ENCEINTE

• Alerte au printemps 2021

- Augmentation de la part des femmes enceintes à partir du mois d'avril 2021
- En lien avec la circulation de nouveaux variants du SARS-CoV-2 (Alpha puis Delta) ayant une transmissibilité¹ et une sévérité² accrues
- Absence de nouveau cas graves de FE depuis la rentrée

Cas pris en charge dans les services de réanimation sentinelles de la région de mars 2020 à octobre 2021

Résultats de séquençage en ARA (source EMERGEN)

¹ transmissibilité 40% à 60% supérieure Delta vs Alpha, ECDC Threat assessment brief, 23/06/2021)

² Kumar et al. 2021; Fisman et al. 2021; Paredes et al. 2021

COVID-19 : DONNÉES CHEZ L'ENFANT

• Circulation virale chez l'enfant

- Proportion de formes asymptomatiques > à l'adulte
- Des taux d'incidence plus faibles que chez l'adulte
- Moindre contribution des enfants de < 10 ans dans la transmission du SARS-CoV-2, en particulier

Source : « COVID-19 in children and the role of school settings in transmission – 2nd update, July 2021, ECDC

Taux de dépistage (/ 100 000)

Taux d'incidence (/ 100 000)

Taux de positivité des tests (%)

COVID-19 : DONNÉES CHEZ L'ENFANT

- Peu de formes graves observées chez l'enfant

	2020					
	< 1 an		< 10 ans			
Cas confirmés par RT-PCR ou TA	576	0,1%	5347	1,2%		
Actes SOS Médecins	79	0,3%	1764	7,2%		
Passages aux urgences	91	0,2%	473	1,1%		
Hospitalisations conventionnelles	101	0,2%	978	2,3%		
Hospitalisations réanimatoires	12	0,2%	234	3,8%		
Décès en milieu hospitalier	0	-	0	-		

Enfants < 1 an : **1,1 %** de la population régionale (Insee, 2018)

Enfants < 10 ans : **12,0%** de la population régionale (Insee, 2018)

Période du 01/01/2020 au 3/10/2021 (SIDEF)

Période du 01/01/2020 au 8/10/2021 (OSCOUR et SIVIC)

COVID-19 : DONNÉES CHEZ L'ENFANT

- Peu de formes graves observées chez l'enfant
- Augmentation de la part des hospitalisations d'enfants âgés de moins de 10 ans entre 2020 et 2021 :
 - Transmissibilité et sévérité accrue des variants Alpha puis Delta
 - Moins d'hospitalisations de personnes âgées (vaccination)

	2020				2021			
	< 1 an		< 10 ans		< 1 an		< 10 ans	
Cas confirmés par RT-PCR ou TA	576	0,1%	5347	1,2%	1109	0,2%	15844	3,2%
Actes SOS Médecins	79	0,3%	1764	7,2%	59	0,6%	1020	9,6%
Passages aux urgences	91	0,2%	473	1,1%	204	0,7%	449	1,5%
Hospitalisations conventionnelles	101	0,2%	978	2,3%	33	0,1%	1014	3,2%
Hospitalisations réanimatoires	12	0,2%	234	3,8%	4	0,1%	291	4,5%
Décès en milieu hospitalier	0	-	0	-	0	-	0	-

Enfants < 1 an : **1,1 %** de la population régionale (Insee, 2018)

Enfants < 10 ans : **12,0%** de la population régionale (Insee, 2018)

Période du 01/01/2020 au 3/10/2021 (SIDEF)

Période du 01/01/2020 au 8/10/2021 (OSCOUR et SIVIC)

COVID-19 : ÉMERGENCE D'UN SYNDROME INFLAMMATOIRE PLURI-SYSTÉMIQUE CHEZ L'ENFANT

- **Fin avril 2020** : signalement de cas de myocardites avec état de choc cardiogénique chez des enfants avec une infection Covid-19 récente
- **PIMS ou MIS-C** = nouvelle entité inflammatoire systémique chez l'enfant
- **Tableau clinique** : Fièvre élevée + altération de l'état général + signes digestifs +/- état de choc, signes cutanés et muqueux
- Entre le 1^{er} mars 2020 et le 26 septembre 2021 : **727 cas de syndromes inflammatoires multi-systémiques pédiatriques (PIMS)** signalés par les pédiatres hospitaliers, dont 80 (11%) en ARA
 - 89% en lien avec la COVID-19
 - 40% de filles
 - Age médian : 7 ans (IQ : 3 à 11 ans)
 - Syndrome inflammatoire systémique **avec myocardite** pour 459 patients (71%)
 - Prise en charge : 2/3 des cas en soins intensifs
 - 1 décès chez un enfant de 9 ans
 - Peu de séquelles à 6 mois (*Penner et al, 2021*)

COVID-19 : ÉMERGENCE D'UN SYNDROME INFLAMMATOIRE PLURI-SYSTÉMIQUE CHEZ L'ENFANT

- Délai moyen de survenue : 4 à 5 semaines après l'infection par le SARS-CoV-2

Fort impact de la pandémie de COVID-19 dans la région

- Auvergne-Rhône-Alpes, épicecentre de la 2^{ème} vague épidémique en France
- Impact limité chez la femme enceinte, le nouveau-né et l'enfant

Une épidémie en constante évolution

- Circulation quasi-exclusive du variant Delta
- Augmentation prévisible de l'incidence chez les enfants (< 12 ans)
- Co-circulation du SARS-CoV-2 et des autres virus saisonniers => risque de tensions hospitalières en pédiatrie

Travaux en cours à Santé publique France

- Mise en place de systèmes de surveillance pour renforcer le suivi des cas pédiatriques de COVID-19 hospitalisés et des nouveau-nés en soins intensifs et réanimation néonatale après une infection maternelle
- Analyse de l'impact de l'épidémie sur la santé maternelle et foétale (complications durant la grossesse et issues de grossesse)

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Remerciements pour leur contribution :

Dr Thomas Bénét et l'ensemble de l'équipe de la cellule régionale,
Julie Boudet-Berquier (Unité Périnatale, Direction des maladies non transmissibles
et traumatismes)