




Stratégie Grippe : vaccination-port du masque au Centre Hospitalier **AN**necy **G**enevois **CHANGE**





Introduction

Centre Hospitalier Anancy Genevois (CHANGE) :

2 sites : Saint Julien en Genevois et Metz-Tessy.

CH de 1433 lits et places, environ 4600 agents.



Site Saint Julien en Genevois

Virus de la grippe
cherche partenaire
pour passer l'hiver



Site Metz-Tessy



Historique

prévention des gripes nosocomiales avant 2015

- **Campagne annuelle de vaccination antigrippale menée par le service de santé au travail (SST) :**
Permanences de vaccination (locaux SST) + Vaccination dans les services sur demande
- **Taux global de vaccination antigrippale (VAG) en 2014-2015 au CHANGE : 16,4 %**
- **6 épidémies de gripes nosocomiales au CHANGE signalées entre 2013 et 2015 :**
 - Services de MCO, SLD et EHPAD
 - Au moins un cas parmi les soignants dans 4 de ces épidémies
 - 3 patients décédés.




À partir de la saison 2015-2016 ⁽¹⁾

- Février 2015 : mise en place d'une alerte informatisée quotidienne des PCR grippe positives du laboratoire à destination de l'EOH
 - vérification des mesures autour de chaque cas
 - repérage précoce des épidémies
 - bilan épidémiologique en fin de saison
- Définition de la stratégie diagnostique et thérapeutique.



À partir de la saison 2015-2016⁽²⁾

Création d'un « groupe grippe » pluridisciplinaire pour la campagne 2015/2016 (14 professionnels) par l'équipe opérationnelle d'infectiologie (EOI) et piloté par un infectiologue



Objectif : améliorer la couverture vaccinale des professionnels afin de réduire la nosocomialité de la grippe.



À partir de la saison 2015-2016⁽³⁾

Référents grippe nommés au sein des services

- **75 référents** nommés
- **Fonction :**
 - Professionnels paramédicaux (93%)
 - Professionnels médicaux (7%)
- **Volontaires** ou **désignés** par le cadre de santé du service
- **Rôles :**
 - Promouvoir la vaccination
 - Logistique (stocks de vaccins, fiches de traçabilité, ...)
 - Vacciner leurs collègues (non obligatoire)
- **Formation :**
 - 79% des référents ont participé à une formation dispensée par infectiologues/ULIN

À partir de la saison 2015-2016⁽⁴⁾

Création de flyers sur les idées reçues concernant la vaccination




Actions coups de poing
(vaccination)

Goodies



Bilan saison 2016-2017

- Augmentation du taux de couverture vaccinale
- Dans 84% des cas, les PCH gouttelettes ont été mises en place dès la suspicion de grippe.



- 509 cas de grippe

68 cas nosocomiaux (13,4%), dont 4 décès

- 12 services avec plus de 2 cas nosocomiaux → port de masque élargi.



Au cours de l'année 2017

- Réflexion port de masque élargi (CH Chambéry, CHU Grenoble, CHU Clermont Ferrand, Hôpitaux Universitaires de Genève)
- Enquête de perception du masque systématique auprès des professionnels
→ 79% des soignants prêts à porter un masque en permanence pendant la période épidémique
- Soumission direction, CME, vote CHSCT → approbation
- Communication à toutes les instances, réunions et formations institutionnelles
- « PORT DE MASQUE ÉLARGI » PRÉVU AU PLUS HAUT DU PIC ÉPIDÉMIQUE (concertation labo/infectiologues/ULIN)
- Communication auprès des professionnels au cours de la période de port de masque.

Saison 2017-2018

MASQUE OBLIGATOIRE



**POUR TOUTE
PERSONNE ENTRANT DANS
CETTE UNITÉ (visiteurs,
professionnels)**

En période hivernale, les résidents de cette unité peuvent développer des complications graves en cas d'infection respiratoire

Bilan saisons 2016-2017 et 2017-2018

	2016-2017	2017-2018
Durée de l'épidémie nationale	10 semaines	16 semaines Masque porté durant 9 semaines
Nb de diagnostics grippe	509	462
Nb cas grippe nosocomiaux sur la période (Taux grippes nosocomiales %)	68 (13,4 %)	40 (8,7 %)
Nombre d'épidémies (>3 cas épidémiologiquement liés)	4	2 (en fin de période de port de masque)
Décès dus à grippes nosocomiales	4	3



Evaluation port de masque 2017/2018

- 1^{er} tour : 15/01/2018 (585 observations)

	Visiteurs	Soignants
Taux observance masque	58 %	83 %
Taux observance masque porté de manière conforme	43 %	64 %

- 2nd tour : 09/02/2018 (546 observations)

	Visiteurs	Soignants
Taux observance masque	59 %	70 %
Taux observance masque porté de manière conforme	43 %	55 %

- Poursuite de la promotion de la vaccination antigrippale
- Port du masque : même stratégie qu'en 2017-2018

	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Durée de l'épidémie nationale	10 semaines	16 semaines Masque porté durant 9 semaines	10 semaines Masque porté durant 6 semaines
Nb de diagnostics grippe	509	462	636
Nb cas grippe nosocomiaux sur la période (Taux grippes nosocomiales %)	68 (13,4 %)	40 (8,7 %)	38 (6,0%)
Nombre d'épidémies (>3 cas épidémiologiquement liés)	4	2	1 (avant instauration du port de masque)
Décès dus à grippe nosocomiale	4	3	4
Taux de vaccination du personnel	29,8%	27,6%	31%



Evaluation port de masque 2018/2019

- 1^{er} tour : (546 observations)

	Visiteurs	Soignants
Taux observance masque	66 %	91 %
Taux observance masque porté de manière conforme	35 %	72 %

- 2nd tour : (460 observations)

	Visiteurs	Soignants
Taux observance masque	52 %	88 %
Taux observance masque porté de manière conforme	43 %	71 %



- Poursuite de la même stratégie
- Redéfinir date de début de port de masque 2019/2020
- Intensifier la communication (données épidémio, masque auprès des visiteurs)



Merci de votre attention