

Les gants au bon moment

Quelle est votre perception ?




Journée régionale de prévention du risque infectieux en EHPAD

Mardi 20 juin 2019

EMH de Vienne

- 21 EHPAD dans un rayon de 36 km
 - 15 indépendants ou rattachés à un groupe
 - 6 adossés à un établissement de santé
 - 1964 lits
- Ressources humaines
 - 0,6 ETP PH
 - 1,1 ETP IDE



Le constat

- Un programme de formation sur les PS réitéré sur l'ensemble des établissements
- L'usage de différentes méthodes pédagogiques :
 - Classique
 - Atelier « objets langage »
 - Simulation (film ou chambre des erreurs)

Un niveau de connaissances élevé lors des formations

Des réponses conformes aux diverses questions posées

Le constat 2

Et pourtant, au quotidien, des pratiques non conformes, trop souvent observées,

- Gants trop portés ou pas assez (prévention des AES)
- Stockés dans les poches
- Pas d'HDM avant, après
- Environnement touché avec des gants souillés ...
- Des convictions sur les non conformités qui parfois, ne laissent pas la place à l'argumentation

Après une brève phase de découragement



L'hygiéniste sait se reprendre rapidement



Décision est prise de proposer aux établissements une évaluation, non pas des pratiques mais de la perception du port des gants chez les professionnels

Le port des gants au quotidien : quelle est votre perception ?



- Proposé par le Cpias ARA
- En phase avec les recommandations
- Proposé aux EHPAD de la filière
- Testé sur un EHPAD volontaire avec le concours d'une élève cadre
- Présenté à la journée d'échanges des référents

Méthodologie

- Proposé à l'ensemble des professionnels de l'établissement
- Seules des situations ne nécessitant pas de gants sont proposées
- Questionnaire distribué sous format papier puis recueilli immédiatement si possible
- Exploitation des résultats sous Excel®

Le port de gants au quotidien : quelle est votre perception ?

Catégorie professionnelle : ☐ Médicale ☐ Paramédicale ☐ Socioéducative ☐ Autre, précisez :

Type établissement : ☐ FAM ☐ MAS ☐ IME ☐ EHPAD ☐ Autre, précisez :

1. Je porte des gants à usage unique non stériles pour les situations/soins suivants pour un résident sans problème infectieux identifié :

1.1 Auscultation cardiopulmonaire :

☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours ☐ non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- ☐ Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- ☐ Pour éviter de me salir les mains
- ☐ Pour protéger les autres résidents
- ☐ Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du résident
- ☐ C'est la pratique du service
- ☐ C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- ☐ Autre, précisez :

1.2 Prise de tension artérielle :

☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours ☐ non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- ☐ Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- ☐ Pour éviter de me salir les mains
- ☐ Pour protéger les autres résidents
- ☐ Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du résident
- ☐ C'est la pratique du service
- ☐ C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- ☐ Autre, précisez :

1.3 Toilette du visage :

☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours ☐ non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- ☐ Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- ☐ Pour éviter de me salir les mains
- ☐ Pour protéger les autres résidents
- ☐ Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du résident
- ☐ C'est la pratique du service
- ☐ C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- ☐ Autre, précisez :

1.4 Transfert du résident lit/fauteuil :

☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours ☐ non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- ☐ Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- ☐ Pour éviter de me salir les mains
- ☐ Pour protéger les autres résidents
- ☐ Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du résident
- ☐ C'est la pratique du service
- ☐ C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- ☐ Autre, précisez :

2. Je porte des gants à usage unique non stériles pour un contact sur peau saine avec un résident porteur de bactérie multirésistante :

☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours ☐ non concerné

Si vous portez des gants parfois, souvent ou toujours, cochez la ou les proposition(s) correspondante(s) ci-dessous :

- ☐ Pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage
- ☐ Pour éviter de me salir les mains
- ☐ Pour protéger les autres résidents
- ☐ Pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du résident
- ☐ C'est la pratique du service
- ☐ C'est plus efficace qu'une friction des mains avec un produit hydro-alcoolique
- ☐ Autre, précisez :



3. Si je sors de la chambre sans avoir retiré mes gants à usage unique non stériles pour aller chercher du matériel en réserve :

- je peux contaminer le matériel de la réserve : ☐ oui ☐ non


- je peux contaminer les autres résidents : ☐ oui ☐ non

Données générales



Nombre de fiches total : 216 Nombre de fiches exploitables : 174 Soit 81%



Nombre de fiches par établissement :







Je porte des gants à usage unique non stériles
pour les situations/soins suivants pour un
résident sans problème infectieux identifié



Auscultation pulmonaire





Prise de tension artérielle





Toilette du visage



Transfert lit/fauteuil




Je porte des gants à usage unique non stérile pour un contact sur peau saine avec un patient porteur de BMR



Si je sors de la chambre sans avoir retiré mes gants, je peux :

contaminer le matériel	contaminer les autres patients
100%	100%



Plan d'actions




- Formation sur les précautions standard :
 - ➡ Sensibiliser les professionnels sur l'utilisation des gants avec un résident porteur de BMR
 - ➡ Travail sur les raisons liées au port des gants :
 - raisons principales : pour me protéger parce que j'ai peur pour ma santé et celle de mon entourage et pour protéger les autres résidents
 - raisons citées plusieurs fois : pour éviter de me salir les mains et pour ne pas avoir de contact direct avec la peau du résident.

Analyse plus approfondie sur le plan psycho-sociologique

Comment passer de l'un à l'autre ?

Connaissances



A reproduire pour les gants ?

« Pour être au plus près de la réalité du terrain, une équipe de psychologues a été sollicitée afin de mieux comprendre et appréhender ce qui peut influencer sur l'observance de l'hygiène des mains chez les soignants »

Site du REPIAS onglet « Hygiène des mains »



ça sert à protéger...

- Les 7 choses à ne pas faire avec un préservatif :

1. Le sortir de son emballage d'origine
2. Le mettre dans sa poche après l'avoir déballé
3. Le choisir trop petit, ou trop grand
4. Le mettre à l'avance
5. Y appliquer un solvant
6. Le garder après l'acte pour lequel il a été porté
7. Le laisser trainer après l'avoir utilisé



Pourquoi le faire avec les gants ?

Diapositive présentée à la JPRI 2018 à LYON par Mme LEGER (CDS Cpias Nvle Aquitaine, membre comité scientifique de la SF2H)

Alors



**Merci pour votre attention et pour
vos éventuelles propositions**