COLLYRES EN NÉONATOLOGIE

Dr Hocine BOUAMARI
HFME CHLS Néonatalogie
Journée Prévention du risque infectieux
CPIAS 14-11-2019

Introduction

- **Conjonctivites néonatales**
- **Collyres antibiotiques et Collyres fortifiés**
- **Pharmacologie**
- **Prophylaxie Recommandations: ANSM**

La conjonctivite

Hyperhémie conjonctivale (rougeur de la conjonctive),
chémosis (conjonctive hypertrophiée) et œdème des paupières

La conjonctivite

- Néonatale < J28, Prélèvement bactério++
- **Etiologie bactérienne**, spécifique
 - **Chlamydia** Trachomatis, **S epidermidis**, **Gonocoque**
 - **S. aureus** 44%, **Strepto. viridans** 22%, **S epidermidis** 16%,
 - E coli in 9%, **H influenzae** 1%, **Strepto.pneumoniae** 2%
(Normann)
- **Etiologie virale** :
 - **HERPES 2, ADENOVIRUS,**
 - **coxsackievirus**
- **Facteurs de risque: Nné ← IST, +/- RPM**
 - Risque de **cécité**
 - complications **extra oculaires** (sepsis , arthrite, pneumopathies)

Les conjonctivites bactériennes

- **Gonocoque**: 0,4/ 1 000 naissances
- HOSPITALISATION, lavages fréquents, larmes artificielles
- Collyres quinolones,
- **CEFOTAXIME** : 100mg/kg IV dose unique
- **Chlamydia trachomatis**: 1,1 à 1,4 /1 000 naissances
- PCR, grattage de cellules épithéliales
- Collyres macrolides Azithromycine 1.5% ou quinolones
- **Ethylsuccinate d'érythromycine** 12,5 mg/kg peros /6 h pendant 2 semaines ou CEFOTAXIME
- **Azithromycine** 20 mg/kg peros 1 fois/jour 3 jours

Les conjonctivites bactériennes

Review: Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis
 Comparison: 1 Antibiotics versus placebo
 Outcome: 1 Clinical remission (early)

Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis Clinical remission (early) Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 12 September 2012

Les conjonctivites virales

- **HSV:**
 - ✓ Local: Ganciclovir pommade (**Virgan**) ou trifluorotidine (**Virophtha**)
 - ✓ voie IV ou Per Os: Aciclovir (**Zovirax**) , Valaciclovir (**Zelitrex**). 5 à 15 mg/kg/jour 3 fois /jour.
- **Adénovirus:**
 - ✓ Antiseptiques locaux à la phase aiguë, +/- antiviraux topiques (**Virgan**).
 - **Les collyres corticoïdes** soulagent phase aiguë, contrôle des infiltrats cornéens, mais dépendance et retard de cicatrisation
 - **ciclosporine 2 %** : opacités séquellaires.

Les Collyres

- **Aminosides (gentamicine, tobramycine):**
 - actifs in vitro sur *Neisseria gonorrhoeae*, mais pas sur *Chlamydia trachomatis*.
- **Ampicilline:** plus disponible
- **Tétracyclines :**
 - actives in vitro sur les 2 espèces ciblées,
 - résistances plasmidiques et chromosomiques **gonocoques**.
 - **AMM** spécialités ophtalmiques >8 ans (dyschromie dentaire).

Les Collyres

- **Ciprofloxacin CILOXAN**_multi dose_aktif in vitro **gonocoque**, mais résistance de haut niveau (40 % en France).
- **Macrolides :**
 - **érythromycine**: aucune spécialité ophtalmologique disponible actuellement en France.
 - **azithromycine: Azyter® unidose**
 - active in vitro sur les 2 espèces, unidose
 - AMM <1 an mais pas destiné à la prophylaxie.
 - apparition résistances acquises de haut niveau ,nord de l'Europe.(1)
- **Picloxydine VITABACT 0,05%** unidose (antiseptique):
 - pas d'étude spécifique activité **gonocoque**.

Les Collyres

- **Povidone iodée (antiseptique):diluée 1,5%**
 - ✓ solution pour irrigation oculaire en récipient **uni dose**, mais grande contenance (20 ml et 50 ml).
 - ✓ **active in vitro** sur les 2 espèces,
 - ✓ **L'AMM** = antiseptie préopératoire **en chirurgie ophtalmique**, ne doit jamais être utilisée en collyre **contre-indication chez le nouveau-né**
- **Rifamycine:**
 - active in vitro sur les 2 espèces ciblées,
 - **AMM** traitement curatif des conjonctivites, kératites et ulcères cornéens
 - pas de contre-indication chez le nouveau-né
 - **expérience clinique** de cette utilisation prophylactique
 - profil de sécurité en administration topique
 - Mais uniquement en **multi-doses**.

Effets secondaires

- **QUINOLONES:** amertume, dépôts cristallisation
- **RIFAMPICINE:** Sulfites Asthme ou anaphylaxie,
- **POVIDONE-IODINE 1,25%:** TSH et iodurie normales
- **TETRACYCLINES:** pas de dyschromie dentaire
- **ERYTHROMYCINE:** sténose du Pylore
- **GENTAMICINE:** conjonctivites pseudomembraneuses, sténoses canaliculaires

Effets secondaires

- **Corticoïdes collyres:**
 - CI si pas de diagnostic étiologique
 - **< 7 jours**
 - Hypertension oculaire
 - Kératite superficielle
 - Cataracte

Collyres Fortifiés

- **kératites bactériennes**
(90 %) : Staphylocoques (26-60 %), Streptocoques (16 %), Pseudomonas et Entérobactéries
- **Concentration** supérieure à celle des collyres
- statut de **préparation hospitalière**
- **Osmolarité** → degré d'évaporation et tolérance oculaire
- **pH** → stabilité, tolérance, degré de pénétration

- **La pénétration intra cornéenne** facilitée par **l'altération de l'épithélium cornéen** et **inflammation cornéenne**

Collyres Fortifiés

- **Indications:**
- **progression de la kératite** > 48 à 72 heures
- Traitement adjuvant **endophtalmie aiguë**
- **Persistance** de l'antibiotique chambre antérieure 3h.
- bithérapie ou trithérapie, synergique, à large spectre,
- **Instillations répétées** : dose de charge / 30 minutes les premières heures puis toutes les heures < H24
- **Effets secondaires** :
- retard de cicatrisation (aminosides, kanamycine, vancomycine)
- toxicité épithéliale cornéenne (aminosides)
- nécrose conjonctivale (aminosides) ,
- réaction allergique , sténose canaliculaire

Perforation cornéenne secondaire à une kératoconjonctivite gonococcique

Collyres Fortifiés

Fr. Ophthalmol., 2007; 30, 4, 423-430C. Chiquet, J.-P. Romanet

Tableau I

Concentrations et péremptions des principaux collyres antibiotiques fortifiés.

<i>Antibiotiques</i>	<i>Dilution</i>	<i>Solvant</i>	<i>Péremption</i>
Amikacine	25-50 mg/ml	NaCl 0,9 %	7 jours
Bacitracine	5 000 UI/ml	NaCl 0,9 %	20 jours 15 jours après ouverture
Cefazoline C1G	50 mg/ml	NaCl 0,9 %	3 jours
Ceftazidime C3G	12,5-20 mg/ml	NaCl 0,9 %	7 jours
Cefotaxime	50 mg/ml	BSS	7 jours
Colimycine	125 000 UI/mL	NaCl 0,9 %	3 jours
Gentamicine	15 mg/ml	NaCl 0,9 %	31 jours 15 jours après ouverture
Imipenem	2-5 mg/ml	NaCl 0,9 %	4 jours
Pipéracilline	20 mg/ml	NaCl 0,9 %	7 jours
Tobramycine	20 mg/ml	NaCl 0,9 %	3 jours
Ticarilline	6 mg/ml	NaCl 0,9 %	28 jours 15 jours après ouverture
Vancomycine	25-50 mg/ml	BSS	30 jours 15 jours après ouverture

PHARMACOLOGIE

Presse Med 2005; 34: 589-95 Marc Labetoulle Systemic adverse effects of topical ocular treatments

PHARMACOLOGIE

Presse Med 2005; 34: 589-95 Marc Labetoulle Systemic adverse effects of topical ocular treatments

Penetration of drugs through the cornea

BIODISPONIBILITE

- **1-5%** du principe actif pénètre l'œil, film lacrymal, épithélium cornéen et la conjonctive, **80%** dans la circulation
- **Bactéricidie**: balance ionisée/non ionisée (**coefficient de dissociation**), AUC, CMAX et CMI
- **Pénétration** :
 - stimulation cornéenne par substances insolubles solides
 - Base salée ionisée qui bute sur l'épithélium cornéen
 - Poids moléculaire, Protéines de transport des larmes et l'évaporation
- **Pénétration**
 - Prodrogues, adjonction antiseptique, inflammation

Les conservateurs

- Indispensables formes **multidoses**, mais **toxiques**
- **Ammoniums quaternaires Chl de Benzalkonium** BAK ++
- **Dérivés organomercuriels**: Thiomersal (Interdits)
- **Aminidines**: chlorhexidine
- **Parabens**
- **Perborates de sodium**: GenAqua
- **Toxicité dose dépendante**, aigue et chronique
- Allergie, cytotoxiques, nécrose et apoptose, stress oxydatif, inflammation, genotoxique, néovascularisation, cicatrisation anormale
- Film lacrymal, Conjonctive ,cornée, trabeculum, cristallin, rétine

Les conservateurs

- RIFAMYCINE Collyre: Thiomersal
- CILOXAN: BAK +
- POVIDONE IODINE: nonoxynol
- TOBREX: BAK +
- BIOCIDAN: BAK+
- FUCITHALMIC: BAK +
- AZYTER: BAK-

PROPHYLAXIE

Recommandations ANSM (2010)

- **Pas de donnée pour recommander de mettre en œuvre une antibioprophylaxie conjonctivale néonatale systématique.**
- **Par mesure de précaution, antibioprophylaxie antécédents et/ou de facteurs de risque d'Infections Sexuellement Transmissibles chez les parents(grossesses non ou mal suivies)**

Enquête en France ANSM 2010

- **1/3** des 68 maternités interrogées **ne pratique pas d'antibioprophylaxie systématique;**
- Pour les 2/3 restants, lorsqu'une antibioprophylaxie est mise en œuvre, la **rifamycine** est la plus souvent utilisée.
- **Les autres produits:** la **ciprofloxacine**, la **gentamicine**, la **picloxydine** et la **tobramycine**.

Enquête en Europe ANSM 2010

- **1/3** des 22 pays ayant répondu, ne **pratique pas d'antibioprophylaxie systématique;**
- **4 pays**, antibioprophylaxie dans **certaines maternités ou en cas de facteurs de risque;**
- pour les autres pays, si antibioprophylaxie, **nitrate d'argent**
- **Les autres produits :** **ampicilline**, **ciprofloxacine**, **érythromycine**, **povidone iodée**, **tétracyclines** et **tobramycine**.

Gonococcies : Nombre de cas pour 100 000, Europe, 2012

PROPHYLAXIE

- **Etats Unis**, l'U.S. Preventive Service Task Force, Systématique → **erythromycine 0,5 %**(4)
- **Canada**, dépistage de toutes les femmes pour N. Gonorrhoeae et C. Trachomatis début de grossesse et 3e trimestre chez les femmes « à risque » ou lors de l'accouchement
- NN une **injection unique de ceftriaxone** (25 à 50 mg/kg) ou **cefotaxime** (100 mg/kg) en plus de la prophylaxie topique: **Erythromycine**

PROPHYLAXIE

- **Nitrate d'argent 1 %:** gonocoque Chlamydia Trachomatis
- **Erythromycine 0,5 % :** Taux d'échec le plus faible
Efficacité sur le C. Trachomatis Pas de conjonctivite chimique
Emergence de souches résistantes
motilité intestinale, entraînant une émission précoce du méconium
- **Povidone-iodine 1,5 %:**
Large spectre antimicrobien (bactérien, mycosique et viral [dont HSV et VIH]) Aucune résistance
Teinte de la conjonctive durant quelques minutes = indicateur de bonne application Faible cout Effet antiseptique
- **Acide fusidique :FUCITHALMIC :** gonocoque Chlamydia Trachomatis
Faible risque d'urgence de résistance Longue demi-vie sans effets secondaire En cours d'évaluation

CONCLUSION

- Collyres indispensables en curatif
- En complément d'un traitement PO ou IV
- Réévaluation de la prophylaxie
- Pharmacocinétique et biodisponibilité spécifique
- Effets secondaires locaux et systémiques
- Conservateurs formes multidoses

MERCI

Bibliographie

- 1-Évaluation de l'efficacité d'un collyre azithromycine 1,5 % versus tobramycine 0,3 % sur les signes cliniques de la conjonctivite bactérienne purulente - 14/04/10 Doi : 10.1016/j.jfo.2010.01.005 P.-Y. Robert □ , T. Bourcier, A. Meddeb-Ouertani, M. Khairallah, K. Zaghloul, A. Amraoui, Y. Bhagat, M. Pop, I. Cochereau
- 2-EFFECT OF TOPICAL 1.25% POVIDONE-IODINE EYEDROPS USED FOR PROPHYLAXIS OF OPHTHALMIA NEONATORUM ON RENAL IODINE EXCRETION AND THYROID-STIMULATING HORMONE LEVEL RALPH RICHTER, MD, HARALD BELOW, PHD, INGRID KADOW, MD, AXEL KRAMER, MD, CORNELIA MÜLLER, PHD, AND CHRISTOPH FUSCH, MD
- 3-S. Triboleta,*, P. Gillardb, A. Lefe`vrea, V. Rigoc Gonococcal ophthalmia neonatorum: Clinical illustration, prevention, and future prospects Archives de Pédiatrie 2016;23:297-3000929-693X/
- 4-Ocular Prophylaxis for Gonococcal Ophthalmia Neonatorum: Reaffirmation Recommendation Statement the American Family Physician Web site at www.aafp.org/afp. Copyright © 2012 American Academy of Family Physicians
- 5-Topical antibiotics for acute bacterial conjunctivitis: Cochrane systematic review and meta-analysis update Aziz Sheikh and Brian Hurwitz
- British Journal of General Practice 2005; 55 (521): 962-964.
- 5-Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis Aziz Sheikh Brian Hurwitz Constant Paul van Schayck Susannah McLean Ulugbek Nurmatov Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 12 September 2012
- 6-Antibiotics for trachoma Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 26 September 2019 Jennifer R Evans Anthony W Solomon Rahul Kumar Angela Perez Balendra P Singh Rajat Mohan Srivastava Emma Harding-Esch
- 7-Particularités des conjonctivites infectieuses de l'enfant A. SAUER, T. BOURCIER, C. SPEEG-SCHATZ réalités pédiatriques # 171_Juin 2012
- C. Dageville
- Recent publications:
- 8 Is prophylaxis against ophthalmia neonatorum justified in French maternity wards?
- Dageville, C. Archives de Pédiatrie • 1 February 2015
- Journal français d'ophtalmologie (2010)33, 505—524D. Vaede C. Baudouin Preservatives in eye drops: Toward awareness of their toxicity